

Taux d'incidence de la transmission nosocomiale

Taux d'incidence des diarrhées associées au *Clostridium difficile* (DACD) par 10 000 jours-présence*

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017 P1 à P10	Taux annuels visés depuis 2016-2017*
Hôtel-Dieu d'Arthabaska	4,1	6,9	6,4	3,4	2,7	2,1	4,7	≤ 5,7
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	10,6	11,9	14,9	8,8	8,3	7,3	5	≤ 10,2
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie	5,4	4	3	4,1	4,8	7	4,1	≤ 7,6
Hôpital Sainte-Croix	11,3	10,6	4,4	4,3	3,9	6,4	3,8	≤ 5,7
Haut-Saint-Maurice	6,4	4	8,5	4,3	3,2	5,6	7,1	≤ 5,0

Taux d'incidence des colonisations nosocomiales à l'*Entérocoque résistant à la vancomycine* (ERV) par 10 000 jours-présence

	2014-2015	2015-2016	2016-2017 P1 à P10	Taux annuel visé
Hôtel-Dieu d'Arthabaska	0	0,2	0,3	≤ 5,6
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	0,31	0,6	0,2	≤ 2,3
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie	2,25	0,6	0	≤ 5,6
Hôpital Sainte-Croix	1,4	5,4	2,9	≤ 5,6
Haut-Saint-Maurice	0	4,2	0	≤ 5,6

Taux d'incidence des colonisations nosocomiales au *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) par 10 000 jours-présence**

	2015-2016	2016-2017 P1 à P10	Taux annuel visé
Hôtel-Dieu d'Arthabaska	1,4	1,9	≤ 4
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	1,7	1,4	≤ 4
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie	9,4	4,4	≤ 4
Hôpital Sainte-Croix	4,5	6	≤ 4
Haut-Saint-Maurice	8,4	5,3	≤ 4

Taux d'incidence de la transmission nosocomiale

*Pour la DACD, le taux annuel visé est différent selon le type d'établissement auquel le centre hospitalier appartient. Dans la région MCQ, nous avons 4 types d'établissements soit :

1. CH non universitaire, < 110 lits = CSHSM
2. CH non universitaire, ≥ 110 lits et proportion de personnes âgées de plus de 65 ans ≥ à 45 % = CHCM
3. CH non universitaire, ≥ 110 lits et proportion de personnes âgées de plus de 65 ans < 45 % = HSC et HDA
4. CH universitaire, ≥ 400 lits = CHAUR

**Ne figure pas parmi les surveillances obligatoires par l'Institut national de santé publique du Québec, surveillance régionale.

N.B.: Les taux d'incidence calculés pour le Haut-St-Maurice sont à interpréter avec prudence, considérant la réalité du faible nombre de jours-présence, rendant les taux moins représentatifs.