





Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de la Vallée-de-la-Batiscan

Direction de santé publique
Janvier 2014

ÉQUIPE SURVEILLANCE-ÉVALUATION
Sylvie Bernier et Yves Pepin

Code de couleur dans le recueil

	Indique un commentaire dans une cellule
	Indique l'absence de nombre dans le RLS, car on ne reprend que la valeur régionale pour le RLS

Taux brut

Le taux brut est le rapport du nombre de cas sur la population à risque de développer l'événement au cours de la période

Le taux brut traduit la vitesse d'apparition des cas dans la population.

Le taux brut sera fortement influencé par la structure d'âge de la population concernée si le phénomène mesuré est intimement associé à l'âge. Ce qui est souvent le cas pour de nombreux indicateurs de santé.

Le taux brut est un bon indicateur du fardeau d'un problème de santé dans une population.

Les taux bruts permettent de prévoir les budgets sanitaires et de planifier les besoins en santé publique.

Taux ajusté

L'ajustement d'un taux pour l'âge permet de produire une mesure qui n'est pas influencée par des structures d'âges différentes.

Les taux ajustés en éliminant l'effet d'âge permettent de comparer la valeur du phénomène dans le temps ou dans l'espace ou encore selon le sexe. Le taux n'a pas de signification en soi puisqu'il réfère à une structure de population fictive.

Le taux ajusté permet de voir si d'autres facteurs que l'âge (habitudes de vie, caractéristiques socio-économiques, facteurs environnementaux, etc.) sont susceptibles d'affecter la problématique.

Taux d'accroissement naturel, 2005-2009 : Taux de natalité - taux de mortalité pour 1000 personnes

Ce taux témoigne si, par sa structure de population, un territoire est en décroissance.

Indice synthétique de fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'auraient les femmes d'un territoire donné si les comportements féconds des femmes observés pour une période donnée perdurent dans le temps

Cette mesure est indépendante de la structure par âge d'une population. Les femmes doivent avoir en moyenne 2,1 enfants pour que les générations se remplacent.

Taux global de fécondité

Nombre de naissances survenues chez les femmes de 15 à 49 ans divisé par la population des femmes de cet âge et multiplié par 1000.

Ce taux est influencé par la structure par âge des femmes.

Taux de fécondité

Nombre de naissances survenues chez les femmes d'un groupe d'âge donné divisé par la population des femmes de cet âge et multiplié par 1000.

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2007-2009

Rapport, pour une période donnée, du nombre de grossesses chez les femmes de 14 à 17 ans, à la population féminine de 14 à 17 ans selon l'âge durant la période.

Taux d'interruption volontaire de grossesse

Rapport, pour une période donnée, du nombre d'interruptions volontaires de grossesse de femmes d'un groupe d'âge déterminé, à la population féminine de ce groupe d'âge durant la période.

Population ayant une identité autochtone

« Identité autochtone » désigne les personnes ayant déclaré être des Autochtones, c'est-à-dire Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit) et/ou ayant déclaré être un Indien inscrit ou des traités c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada et/ou ayant déclaré être membres d'une Première Nation ou bande indienne.

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Familles biparentales : Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans avec au moins deux adultes unis par mariage ou en union libre.

Les familles biparentales sont composées d'un couple marié ou en union avec au moins un enfant de moins de 18 ans apparenté par filiation ou adoption à au moins un des deux membres du couple. Le concept comprend tant les familles intactes que recomposées.

N.B. Les ménages ou des petits-enfants demeurent avec leurs grands-parents (en absence de parents biologiques ou adoptifs) seront aussi considérés comme abritant une famille biparentale.

Familles monoparentales : Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un seul parent biologique ou adoptif.

Les familles monoparentales sont composées d'un seul adulte (sans conjoint) vivant au moins un enfant de moins de 18 ans apparenté par filiation ou adoption.

N.B. Les ménages ou des petits-enfants demeurent avec un seul grand-parent (sans conjoint) seront aussi considérés comme abritant une famille monoparentale.

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Enfants de moins de 18 ans vivant seulement avec un seul de ses parents biologiques ou adoptifs (lui-même sans conjoint) rapportés à l'ensemble des enfants de moins de 18 ans.

N.B. Ce concept inclut aussi les enfants avec un seul de ses grands-parents biologiques ou adoptifs (lui-même sans conjoint) en l'absence de parents.

Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus vivant seules, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Personnes âgées de 65 ans et plus vivant seules dans un ménage privé rapporté à l'ensemble de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé.

Taux d'emploi, 2011 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Population de 15 ans et plus en ménage privé occupant un emploi rapportée à l'ensemble de la population de 15 ans et plus en ménage privé.

Taux de chômage

Population de 15 ans et plus en ménage privé étaient sans emploi rémunéré, étaient prêtes à travailler et avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines précédentes rapportée à la population active de 15 ans et plus en ménage privé (population en emploi et celle en chômage).

Taux de prestataires d'assistance sociale

Rapport de toutes les personnes (adultes et enfants) bénéficiaires de l'assistance sociale à la population de moins de 65 ans.

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2005 Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population dans les ménages privés vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt. Les estimations du nombre de personnes à faible revenu sont basées sur les seuils de faible revenu avant impôt de Statistique Canada connus aussi sous la désignation SFR. Ces limites varient selon la taille du secteur de résidence et la taille du ménage et sont mises à jour annuellement (Statistiques Canada, 2005). Le seuil de faible revenu est un niveau relatif établi à partir des tendances du revenu et des dépenses des différentes catégories de familles (Cotton, 2001). Les seuils de faible revenu avant impôts se définissent comme des « niveaux de revenus selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale de leur revenu avant impôt à la nourriture, au logement et à l'habillement » (Statistique Canada, 2007).

Risque de décrochage scolaire

L'indicateur est construit à partir de trois blocs de questions qui sont communes aux deux questionnaires. Chacun des blocs sert à mesurer un des trois prédicteurs du modèle de régression logistique soit le rendement, le retard et l'engagement scolaires afin de calculer la probabilité de risque de décrocher (Janosz, 2007).

Sécurité alimentaire du ménage

- sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
- insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
- insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).

Soutien social

Cet indicateur est basé sur un indice créé par Statistique Canada à partir d'une liste de huit questions demandant aux gens à quelle fréquence ils bénéficient de certains types de soutien dans diverses circonstances. Les huit questions sont les suivantes : Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin :

- 1) une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?
- 2) une personne qui vous conseille en situation de crise?
- 3) une personne pouvant vous renseigner afin de vous aider à comprendre les situations que vous traversez?
- 4) une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?
- 5) une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?
- 6) une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?
- 7) une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?
- 8) une personne qui comprend vos problèmes? »

(Statistique Canada, 2006b; Statistique Canada, 2006c).

Consommation d'alcool de façon excessive

Soit 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion.

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006, Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

Nombre moyen d'années qu'une personne devrait vivre en bonne santé si les profils actuels de mortalité et d'incapacité continuent de s'appliquer (Last, 2004).

Proportion de la population dans les ménages privés ayant parfois ou souvent une incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables) ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental ou d'un problème de santé (Statistique Canada, 2006; Statistique Canada, 2007).

En 2001 et 2006, l'incapacité est définie à partir de deux questions, l'une portant sur les difficultés rencontrées dans les activités de la vie quotidienne, l'autre sur la réduction des activités pouvant être faites à la maison, au travail ou à l'école. Ces questions font référence aux états physiques ou mentaux et aux problèmes de santé qui ont duré ou qui sont susceptibles de durer six mois ou plus. Pour les jeunes enfants, uniquement les incapacités ou les problèmes qui ont été diagnostiqués par un professionnel devraient être rapportés (Statistique Canada, 2007). Les personnes ayant une incapacité sont celles ayant répondu « Oui, souvent » ou « Oui, parfois » à l'une des questions.

Niveau élevé de détresse psychologique

On définit la détresse psychologique comme le résultat d'un ensemble d'émotions négatives ressenties par les individus qui, lorsqu'elles se présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des syndromes de dépression et d'anxiété. Un indice de détresse psychologique peut être utile quand peu de données sur la santé mentale sont disponibles (Camirand et Nanhou, 2008).

Le niveau élevé correspond au quintile supérieur des scores à l'indice.

Coefficients de variation


* La valeur de l'indicateur présente un coefficient de variation nécessitant une prudence dans l'interprétation des résultats.

** La valeur de l'indicateur présente un coefficient de variation élevé. L'estimation est imprécise et n'est fournie qu'à titre indicatif seulement.

Portrait de santé et responsabilité populationnelle

Comme dans la démarche de planification stratégique régionale 2015-2020, l'angle responsabilité populationnelle devrait animer la lecture du portrait de santé et contribuer à une vision commune de la réalité territoriale avec les partenaires du RLS.

Toute démarche de planification dans le domaine de la santé et des services sociaux doit prendre appui sur un ensemble d'informations qui aideront les décideurs à faire les choix les plus judicieux pour la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population qui habite le territoire concerné. Les connaissances nous ont appris que cette santé de la population est tributaire de quelques grands déterminants : l'environnement physique, l'environnement social et économique, la biologie et la génétique et le système de soins.



Source : Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences

Bien qu'il soit primordial de placer l'organisation des services dans un processus d'amélioration continue, force est de constater que des efforts doivent être consentis sur d'autres dimensions pour améliorer la santé et le bien-être de la population et tenter de réduire la pression sur le système de soins et services. C'est ce à quoi nous sommes conviés dans l'exercice de la responsabilité populationnelle. [1]

Aussi, au moment de faire le portrait sociosanitaire de la population d'un territoire, on s'attarde au premier volet de l'exercice de la responsabilité populationnelle qui est de s'approprier les données sociosanitaires afin d'en arriver à une vision commune des besoins et de la réalité territoriale. Ainsi, si la santé dépend davantage des conditions sociales et économiques et de l'environnement physique (au total 60 %), la façon de regarder le portrait devrait en tenir compte et amener les décideurs à se questionner autant sur les déterminants, environnement physique, social et économique que sur les données sur l'organisation des services de santé et services sociaux. Ainsi, les décideurs pourront explorer ce portrait sur deux angles :

a) En tant que membre du réseau local de soins et de services de santé, quels besoins de santé et bien-être sont prédominants, en émergence ou nous interpellent davantage et exigent des améliorations dans nos façons de faire (qualité, continuité, accessibilité, etc. des soins et services) ? (déterminant système de soins)

b) En tant qu'acteur local et avec nos partenaires des autres secteurs, quelles sont les dimensions sur lesquelles nous devrions agir collectivement pour améliorer l'environnement social et économique et l'environnement physique et qui favoriseront la santé et la qualité de vie pour la population qui habite le territoire ? (ex. : environnement favorable aux saines habitudes de vie, développement de coopératives d'habitation, démarches locales de développement social, etc.)

La question b fera appel à la connaissance que les acteurs du territoire ont de leur milieu, de leurs clientèles ou des communautés, car il n'existe pas de données statistiques sur toutes ces dimensions... C'est dans une démarche collective que cette lecture de la réalité du territoire pourra se construire.

[1] Stratégie nationale de soutien à l'exercice de la responsabilité populationnelle...

Lucie Bonin, md et Lucie Lafrance

Équipe de soutien à l'implantation de la responsabilité populationnelle

Direction de santé publique

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Conditions démographiques

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2013

	RLS			% RLS sur la population régionale
	Hommes	Femmes	Total	
Population totale	12 552	12 029	24 581	4,9
0-17 ans	1 891	1 733	3 624	
0-5 ans	632	609	1 241	
6-11 ans	608	562	1 170	
12-17 ans	651	562	1 213	
18-64 ans	7 789	7 246	15 035	
18-24 ans	930	767	1 697	
25-44 ans	2 358	2 196	4 554	
45-64 ans	4 501	4 283	8 784	
65 ans et +	2 872	3 050	5 922	
65-74 ans	1 766	1 582	3 348	
75-84 ans	783	965	1 748	
85 ans et +	323	503	826	

Source : MSSS, Projections (avril 2012) démographiques

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2013

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Hommes	12 552			
0-17 ans	1 891	15,1	18,1	19,5
18-64 ans	7 789	62,1	64,2	65,6
65 ans et +	2 872	22,9	17,7	14,9
65-74 ans	1 766	14,1	10,9	9,1
75 ans et +	1 106	8,8	6,8	5,8
Femmes	12 029			
0-17 ans	1 733	14,4	17,0	18,3
18-64 ans	7 246	60,2	60,9	63,3
65 ans et +	3 050	25,4	22,1	18,5
65-74 ans	1 582	13,2	11,5	9,8
75 ans et +	1 468	12,2	10,7	8,7

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2013 (suite)				
	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	24 581			
0-17 ans	3 624	14,7	17,5	18,9
18-64 ans	15 035	61,2	62,5	64,5
65 ans et +	5 922	24,1	19,9	16,7
65-74 ans	3 348	13,6	11,2	9,4
75 ans et +	2 574	10,5	8,7	7,3

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2020				
	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	24 959			
0-17 ans	3 728	14,9	17,4	18,9
18-64 ans	13 782	55,2	58,1	61,0
65 ans et +	7 449	29,8	24,5	20,1
65-74 ans	4 299	17,2	13,8	11,4
75 ans et +	3 150	12,6	10,7	8,7

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2009-2013				
	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		0,5	1,8	3,2
0-17 ans		-5,0	-2,8	-0,5
18-64 ans		-2,6	-0,4	1,6
65 ans et +		13,3	14,5	15,1

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2013-2020				
	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	378	1,5	2,7	4,4
0-17 ans	104	2,9	2,0	4,5
18-64 ans	-1 253	-8,3	-4,7	-1,1
65 ans et +	1 527	25,8	26,3	25,8

Taux d'accroissement naturel, 2005-2009

	RLS			Région		Québec	
	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	-1,0	(-0,8 - -1,2)	(-)	1,0	(1,0 - 1,0)	3,6	(3,5 - 3,6)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2012;

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2011 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Population ayant une identité autochtone	180	0,7	(-)	1,8		1,8	

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Fécondité, 2006-2010

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		IC			IC		IC	
Nombre moyen de naissances	205							
indice synthétique de fécondité		1,89			1,75		1,71	
Âge moyen des mères		* 28,3	(28,0 - 28,6)	(-)	* 27,9	(27,8 - 27,9)	* 29,3	(29,3 - 29,3)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		44,1	(41,5 - 46,9)	ns	45,7	(45,2 - 46,3)	46,7	(46,5 - 46,8)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	4	* 7,2	(4,7 - 10,9)	ns	13,6	(12,8 - 14,5)	10,0	(9,8 - 10,2)
20-24 ans	39	75,8	(65,9 - 87,2)	(+)	68,3	(66,4 - 70,2)	52,7	(52,3 - 53,1)
25-29 ans	84	156,3	(142,0 - 172,0)	(+)	140,9	(138,2 - 143,7)	115,7	(115,1 - 116,3)
30-34 ans	56	101,2	(90,0 - 113,8)	ns	95,9	(93,5 - 98,2)	110,4	(109,8 - 110,9)
35-39 ans	18	33,2	(27,0 - 40,7)	(-)	28,6	(27,4 - 30,0)	45,6	(45,2 - 46,0)
40-44 ans	4	* 4,8	(3,1 - 7,6)	ns	3,1	(2,8 - 3,5)	7,2	(7,1 - 7,4)
					* 0,1	(0,1 - 0,2)	0,3	(0,3 - 0,3)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2007-2009

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000		Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse		12,1		12,1	(11,0 - 13,3)	13,0	(12,7 - 13,3)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2013;

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2007-2009

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux d'IVG		9,9	9,9	(9,6 - 10,3)	14,5	(14,4 - 14,6)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Conditions socioculturelles

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2011

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	2 255			
% familles biparentales	1 700	75,4	73,4	75,7
% familles monoparentales	555	24,6	26,6	24,3

Statistique Canada, Recensement de 2011, Profil

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2011

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	865	21,8	23,1	21,1

Proportion de la population vivant seule, 2011

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Population vivant seule	3 825	15,4	15,8	14,2

Proportion de personnes âgées vivant seules, 2011

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Personnes âgées vivant seules	1 460	27,7	31,1	30,4

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2011

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	5 275	91,9	87,1	89,8

Conditions socioéconomiques

Scolarité des 25-64 ans, 2011

	RLS		Région		Québec
	Nbre	%		%	%
Plus haut diplôme atteint					
Population de 25 à 64 ans	13 970				
Inférieur au certificat d'études secondaires	2 690	19,3		17,7	14,8
Certificat d'études secondaires seulement	2 710	19,4		20,6	19,5
Études postsecondaires inférieures au baccalauréat	7 245	51,9		47,9	42,4
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	1 345	9,6		13,8	23,3

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	300	* 25,7	(18,8 - 34,9)	ns	22,6	(19,8 - 25,6)	20,1	(19,3 - 21,2)
Garçons	200	30,0	(22,4 - 38,5)	ns	28,5	(25,1 - 32,2)	24,4	(23,4 - 25,8)
Filles	100	* 22,0	(14,8 - 33,2)	ns	16,4	(13,8 - 19,4)	15,6	(14,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de décrochage au réseau public selon le sexe, 2008-2009

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Total		21,2		21,2		21,3	
Garçons		27,7		27,7		26,1	
Filles		14,3		14,3		16,5	

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 2008-2009

Taux d'emploi, 2011

	RLS		Région		Québec
	Nbre	%		%	%
Taux d'emploi	10 935	50,8	(-)	56,1	59,9

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Taux de chômage, 2011					
	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Taux de chômage	1 020	8,5	(+)	7,5	7,2

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2005					
	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	2 635	11,0	(-)	15,5	17,1
Hommes	1 310	10,8	(-)	13,4	15,0
Femmes	1 330	11,2	(-)	17,5	18,6
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	1 565	6,5	(-)	10,2	12,4

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Taux de prestataires d'assistance sociale, 2013						
	RLS			Région	Québec	
	Nbre	%		%	IC	%
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)		8,9		8,9	(8,8 - 8,9)	6,9

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire, 2013

Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2012						
	RLS			Région	Québec	
	Nbre	%		%	IC	%
Taux de bénéficiaires		53,0		53,0		44,5

Source : RHDCC, sécurité de la vieillesse

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2009-2010						
	RLS			Région	Québec	
	Nbre	%		%	IC	%
Alimentation non précaire		93,6		93,6	(91,5 - 95,7)	93,8
Alimentation modérément précaire		* 4,7		* 4,7	(3,7 - 5,9)	4,3
Alimentation sévèrement précaire		** 1,7		** 1,7	(1,1 - 2,5)	1,8

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Environnement physique

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Exposition fumée secondaire		10,6	10,6	(7,7 - 13,5)	8,9	(8,2 - 9,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2006

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Logements avec réparations majeures	1 010	9,2	7,3	7,7

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2008

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Très satisfaits de sa vie sociale	11 400	56,1	(50,9 - 61,2) (+)	51,1 (48,9 - 53,1)	47,3	(46,4 - 48,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social		9,4	9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	RLS		Région		Québec
	Nbre	%		%	%
Population prodiguant soins aux âgés	5 410	26,0	(+)	20,7	18,6

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Très faible sentiment d'appartenance		* 7,6	* 7,6	(5,4 - 9,9)	10,9	(10,2 - 11,5)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2010-2011

	RLS			Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Élèves victimisés	400	35,6	(29,7 - 41,4)	ns	34,5	(32,6 - 36,5)	37,3	(36,6 - 38,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes		49,6	49,6	(45,3 - 53,9)	48,1	(47,0 - 49,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins 5 portions de légumes et de fruits par jour, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
5 fois par jour ou + des fruits et légumes	500	47,7	48,1	(45,9 - 50,7)	51,5	(50,5 - 52,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif		35,4	35,4	(31,2 - 39,6)	39,1	(38,0 - 40,2)
12-17 ans, très actif		* 36,2	* 36,2	(20,9 - 51,5)	40,5	(36,7 - 44,3)
Garçons		* 48,0	* 48,0	(26,1 - 69,8)	48,1	(42,6 - 53,6)
Filles		** 27,6	** 27,6	(15,8 - 42,2)	32,6	(27,5 - 37,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	300	22,0	31,1	(28,0 - 33,9)	29,8	(28,9 - 30,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de fumeurs dans la population de 12 ans et plus, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Fumeurs actuels		23,2	23,2	(19,7 - 26,8)	22,9	(22,0 - 23,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2009-2010

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Entre 5 et 11 ans		** 1,1	** 1,1	(0,2 - 3,2)	3,1	(2,6 - 3,7)
Entre 12 et 14 ans		* 23,0	* 23,0	(14,7 - 31,4)	20,3	(18,3 - 22,3)
Entre 15 et 19 ans		65,0	65,0	(55,5 - 74,5)	55,4	(52,9 - 57,9)
20 ans et plus		** 10,9	** 10,9	(7,4 - 15,2)	21,2	(19,2 - 23,3)

Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2010-2011 - Statut de fumeur, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fumeurs actuels	200	** 13,7	(7,1 - 21,2)	(+)	7,5	(6,5 - 8,8)	6,9	(6,5 - 7,5)
Fumeurs débutants	0	** 3,6	(1,4 - 5,4)	ns	3,7	(2,9 - 4,6)	3,6	(3,4 - 3,9)
Non-Fumeurs	900	82,8	(74,5 - 90,1)	ns	88,8	(87,0 - 90,2)	89,5	(88,9 - 90,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2010-2011

Consommation excessive d'alcool, 2010-2011	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	600	55,3	(49,6 - 60,5)	(+)	48,3	(45,8 - 50,3)	41,1	(40,4 - 42,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total feux rouges et jaunes	200	14,7		ns	10,1		10,2	
En émergence (feux jaunes)	100	* 5,0	(3,1 - 6,7)	ns	4,5	(3,5 - 5,4)	5,1	(4,8 - 5,4)
Problématique (feux rouges)	100	** 9,7	(4,3 - 16,1)	ns	5,6	(4,5 - 6,9)	5,1	(4,8 - 5,5)

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommateurs actuels de drogues	2 200	* 10,7	(7,3 - 14,5)	ns	11,6	(10,2 - 13,1)	13,1	(12,5 - 13,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	5 300	65,6	(57,6 - 73,9)	(-)	67,0	(64,1 - 69,9)	73,3	(72,0 - 74,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion de femmes 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale en 2009-2010

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	4 066	61,4	(59,9 - 62,9)	(+)	63,9	(63,6 - 64,3)	57,8	(57,7 - 57,9)

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	17 000	90,1	(86,5 - 93,5)	(+)	88,7	(87,2 - 90,2)	82,9	(82,1 - 83,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Cyclistes portant le casque de sécurité, 2008

	RLS	Région	Québec
Port du casque	%	%	%
		25,2	36,5

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008

	RLS	Région	Québec
Non-utilisation de la ceinture	%	%	%
		10,8	9,9

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis		329	329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

Nbre	RLS			%	Région		Québec	
	%	IC			%	IC	%	IC
	84,7	(80,5 - 88,6)	(+)	84,7	(83,0 - 86,3)	78,7	(78,1 - 79,1)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011

Nbre	RLS			%	Région		Québec	
	%	IC			%	IC	%	IC
	78,3	(73,4 - 82,8)	ns	75,7	(73,9 - 77,5)	75,0	(74,5 - 75,5)	

Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011

Nbre	RLS			%	Région		Québec	
	%	IC			%	IC	%	IC
	*11,6	(7,4 - 16,0)	ns	9,5	(7,9 - 11,1)	11,0	(10,6 - 11,5)	

Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011

Nbre	RLS			%	Région		Québec	
	%	IC			%	IC	%	IC
	28,7	(23,7 - 33,5)	ns	27,6	(25,7 - 29,5)	30,5	(30,0 - 31,0)	

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

Nbre	RLS			%	Région		Québec	
	%	IC			%	IC	%	IC
	12,4	(8,8 - 16,2)	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)	

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

		RLS			Région		Québec	
Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
	*8,1	(5,4 - 10,9)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)	

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

		RLS			Région		Québec	
Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
	22,5	(18,1 - 27,1)	ns	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)	

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire de la Vallée-de-la-Batiscan

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2009 à mars 2012)

Taux pour 10 000 personnes	RLS					Région			Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC		%	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%
Total des hospitalisations	2 107	757,9	(732,0 - 784,7)	ns	100	821,6	(815,7 - 827,5)	100	762,9	(761,5 - 764,3)	100
Tumeurs	199	61,1	(54,7 - 68,3)	(-)	9,4	66,1	(64,5 - 67,8)	8,6	70,9	(70,5 - 71,4)	9,4
Maladies de l'appareil circulatoire	377	105,5	(97,5 - 114,2)	ns	17,9	113,6	(111,5 - 115,6)	15,6	106,7	(106,2 - 107,3)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	201	63,0	(56,3 - 70,4)	(-)	9,5	85,3	(83,5 - 87,2)	10,9	74,2	(73,8 - 74,7)	9,9
Maladies de l'appareil digestif	238	81,4	(73,4 - 90,2)	ns	11,3	79,8	(78,0 - 81,7)	9,8	75,5	(75,0 - 75,9)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	179	61,4	(54,5 - 69,2)	(+)	8,5	70,9	(69,2 - 72,7)	8,7	59,2	(58,8 - 59,6)	7,7
Grossesse, accouchements et puerpéralité	230				10,9			11,8			14,9

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

État de santé globale

Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Excellente ou très bonne santé	11 000	54,0	(48,8 - 59,0)	ns	54,1	(52,1 - 56,1)	56,1	(55,2 - 56,9)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Population de 15 ans et plus	2 400	12,0	(8,8 - 15,3)	ns	11,7	(10,5 - 12,9)	10,8	(10,3 - 11,4)
Population de 65 ans et plus	1 200	* 26,3	(16,7 - 36,2)	ns	24,8	(21,5 - 28,5)	21,5	(19,9 - 23,1)

Espérance de vie à la naissance, 2005-2009

	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	79,0	(77,8 - 80,2)	ns		77,6	(77,4 - 77,9)	78,4	(78,4 - 78,5)
Féminin	83,9	(82,7 - 85,0)	ns		83,0	(82,7 - 83,2)	83,1	(83,1 - 83,2)
Total	81,4	(80,6 - 82,3)	ns		80,4	(80,2 - 80,6)	80,9	(80,8 - 80,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006								
	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	66,0	(64,8 - 67,2)	ns		66,3	(66,0 - 66,5)	66,5	(66,4 - 66,5)
Féminin	68,6	(67,6 - 69,6)	ns		68,4	(68,2 - 68,6)	68,3	(68,2 - 68,3)
Total	67,3	(66,5 - 68,1)	ns		67,3	(67,1 - 67,5)	67,4	(67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

Population ayant une incapacité, 2006								
	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%			%	%		
Population ayant une incapacité	3 405	14,2	(+)		12,6		12,6	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, recensement de 2006, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2005-2009									
	Nbre	RLS				Région		Québec	
		Taux	IC			Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	1	** 126,6	(56,9 - 281,8)	ns		130,0	(110,4 - 153,1)	112,9	(108,2 - 117,7)
5-14 ans	1	** 27,2	(8,8 - 84,5)	ns		18,6	(14,0 - 24,7)	11,4	(10,4 - 12,4)
15-24 ans	3	* 107,4	(63,6 - 181,3)	(+)		66,6	(58,0 - 76,5)	45,9	(44,0 - 47,8)
25-44 ans	4	* 82,1	(53,5 - 125,9)	ns		103,0	(95,2 - 111,4)	85,5	(83,8 - 87,3)
45-64 ans	40	461,8	(402,1 - 530,2)	ns		479,5	(464,1 - 495,3)	449,4	(445,5 - 453,4)
65-74 ans	35	1 341,8	(1 158,0 - 1 554,8)	(-)		1 738,5	(1 683,8 - 1 794,8)	1 700,5	(1 685,7 - 1 715,4)
75 ans et +	142	6 099,7	(5 667,1 - 6 565,2)	(-)		6 650,7	(6 537,0 - 6 766,3)	6 649,7	(6 618,0 - 6 681,6)
Tous (brut)	226	922,2	(870,0 - 977,6)	(+)		874,1	(862,5 - 885,9)	734,1	(731,4 - 736,8)
Total (ajusté)	226	670,2	(631,8 - 711,0)	(-)		740,5	(730,6 - 750,5)	719,7	(717,1 - 722,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2005-2009											
	Nbre	RLS				Région		Québec			
		Taux ajusté	IC ajusté			Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	72	215,0	(193,7 - 238,6)	ns	294,1	(265,3 - 326,1)	(+)	240,6	(235,0 - 246,4)	236,5	(235,0 - 238,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	63	179,9	(160,9 - 201,1)	ns	255,0	(228,3 - 284,9)	(+)	189,6	(184,7 - 194,7)	189,4	(188,0 - 190,8)
Maladies de l'appareil respiratoire	23	65,1	(54,2 - 78,3)	ns	93,7	(78,0 - 112,5)	(+)	71,5	(68,5 - 74,6)	64,6	(63,9 - 65,4)
Maladies du système nerveux	10	29,8	(22,7 - 39,2)	(-)	42,4	(32,3 - 55,6)	ns	48,1	(45,7 - 50,7)	43,9	(43,3 - 44,6)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	9	24,5	(18,1 - 33,1)	ns	35,0	(26,0 - 47,2)	ns	25,3	(23,5 - 27,2)	29,2	(28,7 - 29,8)
Traumatismes non intentionnels	10	37,5	(28,2 - 49,7)	(+)	42,4	(32,3 - 55,6)	(+)	32,8	(30,6 - 35,0)	27,1	(26,6 - 27,6)
Maladies de l'appareil digestif	10	30,1	(22,9 - 39,6)	ns	42,4	(32,3 - 55,6)	(+)	27,5	(25,6 - 29,5)	26,7	(26,2 - 27,2)

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2008

	RLS				Région			Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Surpoids	11 600	60,5	(55,2 - 65,9)	(+)	54,0	(51,9 - 56,1)	52,4	(51,5 - 53,2)	
Obésité	3 900	20,5	(16,2 - 25,0)	(+)	18,5	(16,9 - 20,3)	16,3	(15,6 - 16,9)	

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2008

	RLS				Région			Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Insuffisance de poids	500	** 2,4	(0,1 - 4,9)	ns	* 1,9	(1,3 - 2,5)	2,1	(1,9 - 2,4)	

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région			Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	
Population totale							
Un seul problème		25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)	
2 problèmes ou plus		26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)	

65 ans et plus

Un seul problème		28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus		57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV). Institut de la statistique du Québec

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques

	RLS		Région			Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	
Allergies non alimentaires (12 ans et +), 2005		19,3	19,3	(16,6 - 22,0)	24,7	(23,9 - 25,4)	
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +), 2007-2008		18,9	18,9	(15,6 - 22,2)	17,2	(16,4 - 18,0)	
Arthrite (15 ans et +), 2009-2010		12,5	12,5	(9,6 - 15,3)	11,1	(10,4 - 11,8)	
Migraines (12 ans et +), 2007-2008		9,6	9,6	(7,1 - 12,0)	9,1	(8,5 - 9,7)	
Maladies cardiaques (12 ans et +), 2009-2010		8,9	8,9	(6,5 - 11,2)	5,2	(4,8 - 5,7)	
Asthme (12 ans et +), 2009-2010		* 6,4	* 6,4	(4,3 - 8,4)	8	(7,4 - 8,5)	
Thyroïde (12 ans et +), 2005		6,3	6,3	(4,6 - 8,0)	6,7	(6,3 - 7,1)	
Troubles de l'humeur (12 ans et +), 2009-2010		* 6,1	* 6,1	(4,1 - 8,1)	4,9	(4,5 - 5,4)	
Troubles d'anxiété (12 ans et +), 2009-2010		* 5,7	* 5,7	(3,8 - 7,7)	5,3	(4,8 - 5,8)	
Cataracte (18 ans et +), 2005		* 5,1	* 5,1	(3,5 - 6,6)	4,2	(3,8 - 4,6)	
Allergies alimentaires (12 ans et +), 2005		* 4,6	* 4,6	(3,6 - 5,7)	5,8	(5,4 - 6,2)	
Bronchite chronique, emphysème, MPOC (35 ans et +), 2009-2010		* 4,2	* 4,2	(3,1 - 5,6)	4,5	(4,0 - 5,1)	

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2009-2010, 2007-2008 ou 2005 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2010-2011											
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	RLS				Région		Québec	
					% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'hypertension	5 763	20,2	(19,5 - 20,9)	ns	27,9	(27,0 - 28,9)	(+)	20,0	(19,8 - 20,1)	20,7	(20,7 - 20,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2010-2011											
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	RLS				Région		Québec	
					% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence du diabète	2 103	7,4	(7,0 - 7,9)	ns	10,2	(9,6 - 10,8)	(+)	7,5	(7,4 - 7,6)	7,7	(7,7 - 7,7)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010											
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS				Région		Québec	
					Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	165	497,6	(464,2 - 533,4)	ns	673,7	(629,3 - 721,3)	(+)	525,8	(517,4 - 534,3)	531,4	(529,2 - 533,7)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	21	61,1	(50,4 - 74,2)	ns	85,7	(70,8 - 103,8)	ns	69,4	(66,4 - 72,5)	68,7	(67,9 - 69,5)
Cancer du pancréas	4	* 11,0	(7,0 - 17,2)	ns	* 15,5	(9,9 - 24,3)	ns	12,8	(11,6 - 14,2)	13,7	(13,3 - 14,0)
Cancer de l'estomac	3	* 9,3	(5,7 - 15,2)	ns	* 13,1	(8,0 - 21,3)	ns	8,6	(7,6 - 9,8)	10,1	(9,8 - 10,4)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	28	83,0	(70,3 - 98,1)	ns	116	(98,4 - 136,7)	(+)	94,5	(91,1 - 98,2)	90,5	(89,6 - 91,4)
Cancer du sein chez la femme	20	64,1	(52,5 - 78,4)	ns	82,5	(67,9 - 100,2)	ns	63,5	(60,6 - 66,5)	68,9	(68,1 - 69,7)
Cancer de la prostate	18	107,2	(87,0 - 132,3)	ns	141,2	(114,6 - 174,0)	(+)	125,9	(120,0 - 132,2)	120,1	(112,5 - 115,5)
Cancer du rein	8	23,2	(16,7 - 32,1)	(+)	31,0	(22,6 - 42,6)	(+)	15,8	(14,4 - 17,4)	16,0	(15,6 - 16,4)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	9	25,6	(18,9 - 34,5)	ns	35,1	(26,0 - 47,3)	ns	28,7	(26,8 - 30,7)	28,2	(27,7 - 28,7)
Leucémies	5	* 14,7	(9,7 - 22,3)	ns	* 19,6	(13,1 - 29,2)	ns	12,3	(11,1 - 13,7)	13,5	(13,2 - 13,9)
Lymphomes non hodgkiniens	6	* 18,2	(12,6 - 26,2)	ns	* 24,5	(17,1 - 35,0)	ns	19,0	(17,5 - 20,7)	19,8	(19,3 - 20,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2013;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2005-2009											
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS				Région		Québec	
					Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Tumeurs du côlon, rectum et anus	6	* 17,6	(12,2 - 25,4)	ns	* 23,6	(16,4 - 34,0)	ns	28,0	(26,1 - 30,0)	28,2	(27,7 - 28,7)
Tumeurs de l'estomac	1	** 4,3	(2,1 - 9,1)	ns	** 5,7	(2,7 - 12,0)	ns	6,8	(5,9 - 7,8)	7,2	(6,9 - 7,5)
Tumeurs du pancréas	3	* 9,9	(6,1 - 15,9)	ns	* 13,8	(8,6 - 22,3)	ns	12,6	(11,4 - 14,0)	12,6	(12,2 - 12,9)
Tumeurs de la prostate	3	* 20,0	(12,1 - 33,3)	ns	* 24,0	(14,5 - 39,9)	ns	23,3	(20,7 - 26,3)	23,0	(22,2 - 23,7)
Tumeurs du sein chez la femme	4	* 24,4	(15,2 - 39,0)	ns	* 31,5	(20,1 - 49,4)	ns	26,3	(23,8 - 29,0)	30,6	(29,8 - 31,3)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	23	66,8	(55,6 - 80,4)	ns	92,1	(76,6 - 110,7)	(+)	77,4	(74,3 - 80,8)	72,5	(71,6 - 73,3)
Lymphome non hodgkinien	3	* 7,8	(4,5 - 13,4)	ns	* 10,6	(6,1 - 18,2)	ns	8,5	(7,5 - 9,6)	8,0	(7,7 - 8,3)
Leucémie	2	* 6,8	(3,7 - 12,5)	ns	* 9,0	(5,0 - 16,2)	ns	6,8	(5,9 - 7,9)	7,2	(6,9 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2005-2009

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Cardiopathies ischémiques	30	87,3	(74,4 - 102,5)	ns	123,0	(104,9 - 144,3)	(+)	100,5	(96,9 - 104,2)	101,9	(100,9 - 102,9)
Autres formes de cardiopathies	12	34,6	(26,8 - 44,7)	ns	48,9	(38,0 - 63,0)	(+)	35,5	(33,4 - 37,7)	32,4	(31,9 - 33,0)
Maladies cérébrovasculaires	13	36,5	(28,6 - 46,6)	ns	53,0	(41,5 - 67,5)	(+)	33,2	(31,2 - 35,4)	34,6	(34,1 - 35,2)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	4	* 10,1	(6,4 - 16,0)	ns	* 14,7	(9,2 - 23,3)	ns	10,5	(9,4 - 11,8)	9,5	(9,2 - 9,8)

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2005-2009 version M34-2012

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Grippe et pneumopathie	5	* 15,8	(10,8 - 23,2)	ns	* 22,0	(15,1 - 32,1)	(+)	17,7	(16,2 - 19,3)	14,7	(14,3 - 15,1)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	14	38,1	(30,0 - 48,3)	ns	55,4	(43,7 - 70,3)	(+)	40,5	(38,3 - 42,9)	35,6	(35,1 - 36,2)

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2006-2010

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	13	6,5	(5,0 - 8,0)	ns	5,9	(5,6 - 6,2)	5,7	(5,6 - 5,8)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2006-2010

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances prématurées	16	8,0	(6,3 - 9,7)	ns	7,3	(6,9 - 7,6)	7,4	(7,3 - 7,5)

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2006 à 2010

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	17	8,5	(6,8 - 10,3)	ns	8,4	(8,0 - 8,7)	8,3	(8,2 - 8,4)

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2005-2009

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	1	** 5,9	(2,7 - 13,2)	ns	5,3	(4,5 - 6,3)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2005 à 2009										
RLS					Région		Québec			
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC		
Mortalité périnatale	1	** 6,9	(3,3 - 14,5)	ns	7,9	(6,8 - 9,1)	7,2	(6,9 - 7,5)		

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2008										
RLS					Région		Québec			
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	2 700	13,4	(9,5 - 17,1)	ns	14,4	(10,0 - 18,4)	11,1	(9,7 - 12,5)	11,0	(10,5 - 11,6)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2005-2009										
RLS					Région		Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	5	* 20,1	(13,4 - 30,1)	(+)	* 20,4	(13,8 - 30,1)	12,4	(11,1 - 13,9)	9,1	(8,8 - 9,4)
Chutes grand total	3	* 8,9	(5,3 - 14,9)	ns	* 12,2	(7,4 - 20,3)	11,9	(10,7 - 13,2)	10,6	(10,3 - 10,9)
Chutes	2	** 5,0	(2,4 - 10,3)	ns	** 6,5	(3,3 - 13,0)	5,6	(4,8 - 6,5)	4,6	(4,4 - 4,8)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	1	** 3,9	(1,8 - 8,1)	ns	** 5,7	(2,7 - 12,0)	6,3	(5,5 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,3)
Chutes (65 ans et plus)	3				* 56,4	(33,4 - 95,2)	80,2	(72,0 - 89,4)	68,5	66,4 - 70,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

État de santé physique - maladies infectieuses

Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2012										
RLS					Région		Québec			
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC		
Taux d'incidence pour 100 000	34	138,6	(99,0 - 194,0)	(-)	279,0	(264,7 - 294,0)	251,0	(248,0 - 254,9)		

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2009-2010										
RLS					Région		Québec			
	Nbre	%			%	IC	%	IC		
Pas en bonne santé mentale		* 4,7			* 4,7	(3,7 - 5,9)	4,0	(3,6 - 4,4)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2009-2010										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%			% ajusté	IC		% ajusté	IC	
Ensemble des troubles mentaux		11,0			11,0	(10,9 - 11,1)		11,5	(11,5 - 11,5)	
Troubles anxio-dépressifs		6,7			6,7	(6,6 - 6,8)		7,4	(7,3 - 7,4)	
Troubles schizophréniques		0,4			0,4	(0,4 - 0,4)		0,4	(0,4 - 0,4)	

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2009-2010										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%			%	IC		%	IC	
Stress quotidien élevé		24,4			24,3	(20,6 - 27,9)		26,4	(25,4 - 27,4)	

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2009-2010										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%			%	IC		%	IC	
Stress quotidien élevé au travail		35,5			35,5	(29,9 - 41,1)		37,3	(36,0 - 38,7)	

Proportion des travailleurs ayant une latitude décisionnelle faible au travail, 2008										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC		%	IC	
Latitude décisionnelle faible au travail	5 100	46,2	(37,9 - 53,8)	ns	47,2	(44,3 - 50,2)		43,9	(42,7 - 45,2)	

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2008										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	
Population de 15 ans et plus	3 500	16,9	(12,9 - 21,1)	(-)	17,1	(12,8 - 21,5)	(-)	20,5	(18,7 - 22,4)	22,1
Hommes	1 100	* 10,4	(5,7 - 15,4)	(-)	* 10,9	(5,5 - 16,5)	(-)	15,7	(13,5 - 18,3)	18,4
Femmes	2 400	23,8	(16,9 - 30,8)	ns	23,5	(16,1 - 31,4)		25,1	(22,4 - 27,6)	26,1

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2010-2011										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC		%	IC	
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	300	22,0	(17,2 - 28,4)	ns	18,8	(17,0 - 20,8)		20,8	(20,1 - 21,6)	

Source : - Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2008										
RLS					Région			Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC		%	IC	
Songé sérieusement au suicide	500	** 2,4	(0,8 - 4,3)	ns	1,7	(1,2 - 2,2)		2,3	(2,1 - 2,6)	

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2005 à 2009

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux brut	Taux ajusté	IC ajusté	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Mortalité par suicide	3	* 10,6	* 10,8	(6,1 - 18,9)	ns	(6,1 - 18,2)	ns	20,3	(18,6 - 22,2)	15,2	(14,9 - 15,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2012

	RLS		Région			
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans		9,2	9,2	(8,6 - 9,9)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	RLS		Région			
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois		7583,5	7583,5	(7304,8 - 7872,9)	6090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2010-2011

	RLS				Région			
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	500	41,8	(33,3 - 50,9)	ns	37,0	(34,9 - 39,0)	40,7	(40,0 - 41,5)

Source : - Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, Institut de la statistique du Québec

Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009

	RLS		Région			
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 100 000 femmes		386,0	386,0	(374,3 - 398,0)	417,2	(414,1 - 420,3)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).