


LOGIGRAMME DES INDICATIONS ET DES PRIORITÉS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

*** Toute personne guérie de la COVID-19 depuis moins de 3 mois ne doit pas subir de nouveau dépistage ***



NOTE 1

Éclosions en milieux de soins ou d'hébergement : CH, CHSLD, URFI, milieu carcéral, itinérance, milieu tampon, RPA, RI-RTF.

NOTE 2

Liste des symptômes à la page 4.

Patients asymptomatique à l'urgence


Les tests de dépistage ne sont pas recommandés pour les patients asymptomatiques de COVID-19 à l'urgence, et ce, afin de rehausser le nombre de tests populationnels et chez les patients pour lesquels il n'est pas requis d'attendre le résultat avant une admission ou un congé.

Rév. : 2021/07/08

Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec

LOGIGRAMME DES INDICATIONS ET DES PRIORITÉS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

*** Toute personne guérie de la COVID-19 depuis moins de 3 mois ne doit pas subir de nouveau dépistage ***



Annexe 1 — M-17

Pour les employés travaillant sur le territoire Mauricie-Centre-du-Québec	
M 17	<p>Dépistage systématique de travailleurs de la santé <u>asymptomatiques, hors éclosion</u></p> <p>Pour les unités COVID-19 (ex.: ENPQ) ⇒ Dépistage recommandé 2 fois/semaine, peu importe le palier d’alerte en vigueur.</p> <p>Pour les travailleurs de la santé en CHSLD, RI, RNI, RPA, RTF et SAD: ⇒ Dépistage recommandé 2 fois/semaine pour une période ciblée par la santé publique (en fonction des indicateurs épidémiologiques du RLS de l’établissement).</p>

Pour les travailleurs de la santé (TdeS) travaillant HORS région Mauricie-Centre-du-Québec	
M 17	<p>Dépistage systématique de travailleurs de la santé <u>asymptomatiques, hors éclosion</u></p> <p><u>Selon le palier d’alerte en vigueur dans la région:</u></p> <p>⇒ Vert: test non recommandé</p> <p>⇒ Jaune : test recommandé <u>une fois par mois</u> dans les milieux ci-dessous.</p> <p>⇒ Orange: test recommandé <u>aux deux semaines</u> dans les milieux ci-dessous.</p> <p>⇒ Rouge: test recommandé <u>chaque semaine</u> dans les milieux ci-dessous.</p> <p><u>Milieux:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans les milieux de vie pour personnes vulnérables à la COVID-19 (ex. : CHSLD, soins palliatifs, psychiatrie, réadaptation physique ou déficience physique, etc.). • Pour les travailleurs de la santé « critiques » (ex.: inhalothérapeutes, infirmières des unités d’hémodialyse, de soins critiques et du bloc opératoire, etc.). • Pour les travailleurs dans les unités de soins aux personnes greffées de la moelle ou en thérapie de cellules souches.

Annexe 2 — Symptômes de la COVID-19

Usager de 0 à 5 ans qui présente depuis plus de 24 heures :

- 1- Fièvre: 38,5 degré C et plus par voie rectale
- 2- Symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer,
- 3- Mal de gorge **ET** fièvre modérée (38,1 degré C par voie rectale)
- 4- Douleurs abdominales, vomissements **OU** diarrhée **ET** fièvre modérée (38,1 degré C par voie rectale)

Usager de 6 à 17 ans ou adulte qui présente une (1) des présentations cliniques suivante (lorsque le ou les symptômes apparaissent de novo):

- 1- Fièvre 38,1 degré C et plus par voie buccale
- 2- Anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans agueusie.
- 3- Symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer
- 4- Mal de gorge

OU

Deux (2) symptômes parmi les suivants, persistant depuis plus de 24 heures:

- Céphalée
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante
- Nausées ou vomissements
- Douleurs abdominales
- Diarrhée

Symptômes atypiques **gériatriques**

Changement de comportement

Soit un nouveau comportement ou arrêt d'un comportement existant.

- Agité
- Pas comme d'habitude
- Agressivité/irritabilité
- Perte d'appétit
- Perturbation du sommeil

Changement soudain de l'état mental

- Plus confus
- Plus somnolent
- « On ne le reconnaît plus »
- Ne sait plus comment utiliser ses affaires

Perte d'autonomie

- Chute
- Incontinence nouvelle
- N'est plus capable de participer aux soins comme avant