

DESTINATAIRES :	Le personnel, les gestionnaires et les médecins du CIUSSS MCQ et les médecins de la région
EXPÉDITRICES :	Geneviève Campbell, adjointe à la directrice – prévention et contrôle des infections  Dre Lise-Andrée Galarneau, médecin officier de la prévention et contrôle des infections
DATE :	Le 19 décembre 2022
OBJET :	<b>Mise à jour des ordonnances collectives relatives au dépistage des virus respiratoires</b>

---

Dans le contexte de la circulation concomitante des virus de l'influenza, du virus respiratoire syncytial (VRS) et du SARS-CoV-2, des tests de dépistage combinés sont maintenant disponibles. Les ordonnances collectives (OC) existantes pour le dépistage des virus respiratoires ont donc été remaniées en conséquence et deviennent les suivantes :

- OC-15-022 *Initier un test diagnostique pour la détection du **virus SARS-CoV-2 chez les usagers adultes asymptomatiques** (anciennement *Initier un test diagnostique chez les usagers adultes présentant des symptômes ou non du virus SARS-CoV-2, dans les unités d'hospitalisation ou de réadaptation*).*

  - Cette OC contient toutes les indications de dépistage chez les usagers qui ne présentent pas de symptômes (dépistage systématique des admissions, dépistage préopératoire, dépistage des contacts asymptomatiques dans le cadre d'une éclosion, etc.).
  - Les consignes pour les usagers adultes symptomatiques sont désormais dans l'OC-15D-008.

- OC-15D-008 *Demander ou initier un prélèvement pour la recherche de **virus respiratoires incluant l'influenza, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le virus du SARS-CoV-2 chez les usagers symptomatiques** (anciennement *Demander ou initier un prélèvement nasopharyngé pour la recherche d'influenza*).*

  - Un algorithme est maintenant disponible pour faciliter la prise de décision par l'infirmière quant au(x) test(s) requis pour l'utilisateur.

La documentation est disponible au [ciusssmcq.ca](https://ciusssmcq.ca) > COVID-19 – Employés > Prélèvements et dépistages, dans la section Ordonnances collectives COVID-19.

L'OC-15-023 *Initier un test diagnostique chez les enfants (trois mois et plus) et adultes présentant des symptômes ou non du virus SARS-CoV-2, dans les secteurs d'urgence*, a quant à elle été abolie puisqu'elle a été intégrée aux deux autres ordonnances collectives ci-dessus.

Ainsi, lorsqu'un usager présente des symptômes d'une infection respiratoire aiguë pour laquelle il est indiqué de le dépister, l'analyse pour la recherche d'influenza, de VRS ou de SARS-CoV-2 peut être demandée sur le même spécimen. **Il est important que ce spécimen soit prélevé par voie nasopharyngée**, autrement la combinaison de la recherche d'influenza et de VRS avec le SARS-CoV-2 n'est pas possible et sera refusée.

Indications de dépistage de l'influenza		Indications de dépistage du VRS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usagers hospitalisés sur une unité de soins (incluant la pédiatrie, la psychiatrie et l'UCDG), ou en attente d'hospitalisation à l'urgence;</li> <li>• Usagers couchés sur civière à l'urgence;</li> <li>• Résidents ou usagers d'un milieu de vie ou de réadaptation situé dans les installations du CIUSSS MCQ (CHSLD, URFI, UTR en santé mentale);</li> <li>• Usagers des services ambulatoires présentant un facteur de risque ou pour qui un traitement antiviral pourrait être envisagé (oncologie, hématologie, hémodialyse et obstétrique);</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientèle pédiatrique hospitalisée ou en attente d'hospitalisation à l'urgence;</li> <li>• Résidents des CHSLD.</li> </ul> <p><b>Note :</b> la gestion d'une infection par le VRS chez la clientèle adulte hospitalisée ou ambulatoire se fait de la même manière que pour les autres virus du rhume. Il n'est donc pas pertinent d'en demander le dépistage.</p>	
Toute demande de dépistage ne répondant pas à ces critères doit faire l'objet d'une prescription individuelle et être discutée au préalable entre le prescripteur et l'infectiologue de garde au laboratoire.			
Indications de dépistage du SARS-CoV-2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usagers n'ayant pas d'épisode antérieur de COVID-19 ou dont l'épisode antérieur date de 60 jours ou plus ET répondant aux indications de dépistage de l'influenza ou du VRS, ou du <i>Logigramme des indications et des priorités de dépistage</i> (M7) disponible ici : <a href="https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/">https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/</a>.</li> </ul>			
Saisie dans Médiclinic pour les tests combos			
Analyses à réaliser en fonction de l'évaluation de l'infirmière		Groupe d'analyses selon le libellé de Médiclinic	
SARS-CoV-2 seulement		→	Virus Coronavirus (2019-nCoV) Covid-19?
Influenza A et B et SARS-CoV-2		→	Influenza A/B/Covid19 par PCR
Influenza A et B et VRS		→	Influenza A/B et VRS par PCR
Influenza A et B, VRS et SARS-CoV-2 (clientèle pédiatrique seulement)		→	Combo pédiatrique influenza A/B/RSV/COVID par PCR

Pour le dépistage de la COVID-19, afin de sélectionner la bonne priorité de dépistage, consultez le *Logigramme des indications et des priorités de dépistage* disponible ici : <https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/>.

Un algorithme est disponible à l'annexe 1 de l'OC-15D-008 ainsi qu'au [ciusssmcq.ca](https://ciusssmcq.ca) > COVID-19 – [Employés > Prélèvements et dépistages](#) dans la section *Ordonnances collectives*.

Merci de votre habituelle collaboration.