

## Dépistage systématique entre les travailleurs de la santé qui sont asymptomatiques en CH, à l'URFI, à l'UCDG et en CHSLD<sup>1</sup>

	Particularités
<b>Conditions préalables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le professionnel qui effectue le dépistage doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires.</li> <li><u>Le travailleur qui se fait dépister par un collègue doit être ASYMPTOMATIQUE.</u> Le cas échéant, il doit quitter le milieu de travail sur-le-champ et contacter le Service aux employés et qualité de vie au travail.</li> <li>Le dépistage entre pairs doit avoir lieu dans un lieu fermé et isolé. <u>Aucun dépistage dans les aires communes</u> (ex : poste de garde, vestiaire, salle de bain, etc.).</li> </ul>
<b>Avant le dépistage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire le lien avec le laboratoire afin d'avoir accès aux milieux de Hank's.</li> <li>Préparer le matériel nécessaire, selon l'aide-mémoire <i>Matériel de prélèvement SARS-CoV-2</i> disponible au <a href="#">CIUSSS MCQ &gt; COVID-19 &gt; Prélèvements et dépistages &gt; Analyses, spécimens et prélèvements.</a></li> <li>Préparer et compléter les requêtes de laboratoire (<i>FOR-15-880</i>) et enregistrer le prélèvement au nom du Dre Lise-Andrée Galarneau, à la priorité M5.</li> </ul>
<b>Au moment du prélèvement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>S'assurer que le travailleur n'a pas de symptôme associé à la COVID-19.</u></li> <li>Procéder à l'hygiène des mains.</li> <li>Porter l'ÉPI : masque, lunettes de protection ou visière, gants et blouse. La blouse peut être conservée pour tous les travailleurs, mais les gants doivent être changés entre chaque dépistage + hygiène des mains.</li> <li>Procéder au prélèvement selon l'aide-mémoire <i>Écouvillonnage des voies oropharyngées et nasopharyngées</i> disponible au <a href="#">CIUSSS MCQ &gt; COVID-19 &gt; Prélèvements et dépistages &gt; Analyses, spécimens et prélèvements.</a></li> </ul>
<b>Après le prélèvement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le spécimen selon les modalités de transport déterminées. Au besoin, consultez l'aide-mémoire <i>Traitement d'un spécimen de SARS-CoV-2</i> disponible au <a href="#">CIUSSS MCQ &gt; COVID-19 &gt; Prélèvements et dépistages &gt; Analyses, spécimens et prélèvements.</a></li> <li>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.</li> <li>Nettoyer les surfaces de travail.</li> </ul>

<sup>1</sup> Pour les dépistages entre pairs en CHSLD, vous référer à la règle de pratiques professionnelles RPP-15-007 *Dépistage préventif pour le virus du SARS-CoV-2 entre pairs chez le personnel asymptomatique œuvrant dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les services de soutien à domicile (SAD)* disponible au [CIUSSS MCQ > COVID-19 > Prélèvements et dépistages > Analyses, spécimens et prélèvements.](#)