

## **CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ À L'ACCUEIL CLINIQUE :**

- Usager âgé de 16 ans et plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire rapidement disponible)
- Usager ayant un médecin de famille et référé par lui sur une requête correctement complétée
- Usager ambulatoire ou nécessitant l'aide d'une seule personne
- Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
  - Rythme cardiaque plus petit ou égal à 120 battements par minute
  - Rythme respiratoire plus petit ou égal à 30 par minute
  - Pression artérielle systolique plus grande que 90 mmHg ou plus petite que 200 mmHg
  - Pression artérielle diastolique plus petite que 120 mmHg
  - Température plus grande que 35°C ou plus petite ou égale à 38.5
  - SaO<sub>2</sub> plus grande ou égale à 90%
- Usager ne présentant pas une altération de l'état de conscience
- Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements actifs
- Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte

## **CRITÈRES D'EXCLUSIONS À L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE:**

- Usager âgé de moins de 30 ans et absence de tous les critères suivants:
  - douleur abdominale
  - diarrhée sanglante
  - antécédent de maladie inflammatoire
  - histoire familiale de maladie inflammatoire
  - histoire familiale de cancer du colon diagnostiqué chez un membre de la famille avant l'âge de 50 ans
- Rectorragie non significative (sang goutte à goutte sur le papier de toilette)
- En présence des signes et symptômes suivants, tout au long du processus, référer l'utilisateur à l'urgence:
  - Hypotension orthostatique
  - Douleur abdominale non soulagée par analgésique
  - Résultat d'hémoglobine plus petit que 90 g/L
  - Facteurs de co-morbidités multiples (insuffisance cardiaque sévère, MPOC sévère, mobilité réduite)
  - Température buccale plus grande ou égale à 38.5° C
  - Oligurie de 12 h et plus
  - Plus de 2 rectorragies en 12 h (abondantes, sang rouge clair; + ou – caillots)