

ORDONNANCE COLLECTIVE

TRAITEMENT DES VERRUES	OC-T-C2
Référence à un(e) : <input type="checkbox"/> Méthode de soins <input type="checkbox"/> Règle de soins Titre : _____	
Professionnels visés par l'ordonnance et secteur(s) d'activité(s) : ▪ Infirmières exerçant en CLSC au CSSS Vallée-de-la-Batiscan	
Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : ▪ Clientèle de moins de 70 ans	
Activités réservées : ▪ Effectuer et ajuster les traitements médicaux	

INDICATION :

- Verrue plantaire ou verrue vulgaire diagnostiquée.

CONDITION :

- Sur référence médicale établissant le diagnostic et le site de la(des) lésion(s).



CONTRE-INDICATIONS :

- Clientèle de 70 ans et plus, compte tenu du risque plus élevé de néoplasie cutanée.
- Lésion présente sur la tête (visage et oreilles).
- Diabète avec polyneuropathie périphérique (↓ sensibilité aux extrémités).
- Maladie vasculaire périphérique.
- Doute d'infection locale (rougeur diffuse, écoulement).

LIMITE :

Retourner au médecin si :

- Procédure non tolérée, en particulier chez les enfants.
- Absence de réponse favorable en 5 traitements, ou progression de la lésion, pour les verrues situées sur les membres supérieurs.
- Absence de réponse favorable en 10 traitements, ou progression de la lésion, pour les autres sites.

Adoption par le CMDP :	 _____ Rémi Grandisson, président du CMDP
Validé par la DSOPQS:	 _____ Chantal Carignan
Date d'entrée en vigueur : <u>Septembre 2009</u>	Date de révision : <u>2014-02-12</u>

Interventions de l'infirmière en application de son champ d'exercice et des activités qui lui sont réservées

Effectuer et ajuster les traitements médicaux

- Émondage de la lésion avec une lame de scalpel pour éliminer la surface cornée, sans faire saigner. Ne devrait pas être douloureux.
- Cryothérapie par applications répétées d'azote liquide avec un écouvillon, jusqu'à blanchiment s'étendant à 1 mm au pourtour de la lésion, et persistant pour 30-60 secondes ou atteinte de la tolérance limite du client.
- La procédure pourra être répétée aux 2 semaines.
- On peut suggérer l'application quotidienne de produit kératolytique en vente libre pour accélérer le processus entre les traitements de cryothérapie (Ex : Soluver, Duofilm, Compound W). Privilégier les solutions liquides avec applicateur plutôt que des onguents. Aviser que la verrue deviendra blanchâtre et avec des points noirs.
- Recommander de couvrir la lésion en cas de saignement, et d'éviter les contacts directs avec la verrue afin d'éviter de s'auto-contaminer.
- Si un client présentant des contre-indications à l'application de la présente ordonnance collective se présente avec une ordonnance individuelle, référer le client au médecin de notre clinique de cryothérapie, et en aviser le médecin prescripteur.