




Un regard averti

sur l'état de santé de la population
de la Mauricie et du Centre-du-Québec



Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle
Juin 2019

ÉQUIPE SURVEILLANCE

Sylvie Bernier, Frédéric Lemay, Yves Pepin et Fortuné Sossa

TABLEAUX DES INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉPARTIS SELON LES PROGRAMMES SERVICES

Ce fichier Excel présente par programme services (tels que définis par l'architecture des services de santé et des services sociaux du MSSS), les indicateurs retenus pour les portraits de santé produits pour le plan annuel du CIUSSS pouvant concerner le programme. Les onglets présentent aussi la disponibilité de l'indicateur au niveau géographique (régional ou locale) et sa fréquence de mise à jour.

Contenu des portraits

Les indicateurs retenus sont tirés pour l'essentiel du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants et ils se retrouvent pour l'essentiel à l'Infocentre national de santé publique.

Les indicateurs du Plan national de surveillance sont ceux convenus par la table de concertation nationale de surveillance (TCNS) et les autres tables thématiques de Santé publique (TCNMI, TCNSE, TCNST). Il s'agit des indicateurs de l'état de santé et de ses déterminants qui ont été convenus de suivre dans le temps pour répondre à l'obligation légale des directeurs de santé publique d'élaborer des plans de surveillance.

Il s'agit d'indicateurs populationnels davantage en lien avec la prévention/promotion en santé publique. Il ne s'agit pas du portrait des clientèles. Dans ce contexte, certains programmes services auront peu d'indicateurs propres (ex : TDI-TED).

Les sources

Les sources de données sont multiples, certaines sont annuelles (naissances, mortinaissances, décès, hospitalisations) et produites par le MSSS, mais elles demandent toutes d'être validées et que le fichier soit fermé avant d'être utilisées, ainsi il ne s'agit pas de données en temps réel. Des retards sont fréquents. De plus, le fichier des tumeurs (FITQ) n'est plus produit et le Registre québécois des cancers ne permet pas encore de produire des indicateurs sur une période d'années suffisante. D'autres sources exigeant un jumelage de fichiers (SISMACQ ou les grossesses) sont aussi produites annuellement, mais peuvent présenter des délais de production.

Les autres sources de données proviennent soit d'autres ministères (SAAQ, MEES, MSP, etc.) à leur fréquence propre, soit du Recensement (aux 5 ans), soit d'enquêtes : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), etc. Ces enquêtes sont à fréquence variable (aux 2 ans en continu pour l'ESCC, aux 5 ou 6 ans pour l'EQSP ou l'EQSJS ou parfois ponctuelles) et portent sur des années différentes. Le contenu de ces enquêtes (ENM, ESCC, EQSP) peut aussi varier même si elles sont répétées et affecter la fréquence de production des indicateurs.

De façon générale, un portrait ne peut donc pas techniquement être produit pour une même unité de temps ou à une fréquence annuelle. Les portraits sont réalisés à une fréquence d'au maximum 5 ans, pour permettre d'interpréter une évolution avec un maximum d'information à jour. De fait, même si certaines sources sont mises à jour annuellement, les mesures les utilisant portent généralement sur 5 ans pour assurer une puissance statistique aux indicateurs produits à l'échelle d'une région ou d'un RLS.

La mise à jour annuelle reste toutefois réalisable pour certains indicateurs sous forme de tableaux de bord, qui pourraient être produits par l'Infocentre du CIUSSS si cette fréquence s'avère incontournable.

Table des matières

	Pages
Général	4 à 10
Santé physique	11 à 17
Santé publique	18 à 26
Services généraux	27 à 31
Perte d'autonomie liée au vieillissement	32 à 36
Déficiences physiques	37 à 38
DI TED	39
Jeunes en difficulté	40 à 41
Dépendances	42 à 43
Santé mentale	44 à 47
Lexique	48

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

GÉNÉRAL

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS			% RLS sur la population régionale
	Hommes	Femmes	Total	
Population totale	49 041	48 519	97 560	18,8
0-17 ans	9 347	8 842	18 189	
0-5 ans	3 085	2 906	5 991	
6-11 ans	3 338	3 147	6 485	
12-17 ans	2 924	2 789	5 713	
18-64 ans	29 047	27 514	56 561	
18-24 ans	3 556	3 277	6 833	
25-44 ans	11 833	10 951	22 784	
45-64 ans	13 658	13 286	26 944	
65 ans et +	10 647	12 163	22 810	
65-74 ans	6 556	6 560	13 116	
75-84 ans	3 106	3 726	6 832	
85 ans et +	985	1 877	2 862	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Hommes	49 041			
0-17 ans	9 347	19,1	17,9	19,3
18-64 ans	29 047	59,2	59,8	62,8
65 ans et +	10 647	21,7	22,4	17,9
65-74 ans	6 556	13,4	13,7	10,8
75 ans et +	4 091	8,3	8,7	7,0
Femmes	48 519			
0-17 ans	8 842	18,2	16,9	18,4
18-64 ans	27 514	56,7	57,3	60,7
65 ans et +	12 163	25,1	25,8	21,0
65-74 ans	6 560	13,5	13,7	11,2
75 ans et +	5 603	11,5	12,1	9,8

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019 (suite)

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	97 560			
0-17 ans	18 189	18,6	17,4	18,8
18-64 ans	56 561	58,0	58,6	61,7
65 ans et +	22 810	23,4	24,1	19,4
65-74 ans	13 116	13,4	13,7	11,0
75 ans et +	9 694	9,9	10,4	8,4

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2024

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	99 936			
0-17 ans	18 803	18,8	17,8	19,4
18-64 ans	54 087	54,1	54,5	58,6
65 ans et +	27 046	27,1	27,8	22,1
65-74 ans	14 586	14,6	15,1	12,0
75 ans et +	12 460	12,5	12,7	10,1

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014 à 2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		2,8	2,1	4,0
0-17 ans		1,6	3,0	5,7
18-64 ans		-2,9	-3,6	-0,3
65 ans et +		21,4	18,6	18,2

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019 à 2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	2 376	2,4	2,0	3,6
0-17 ans	614	3,4	4,3	6,3
18-64 ans	-2 474	-4,4	-5,1	-1,8
65 ans et +	4 236	18,6	17,6	17,8

Taux d'accroissement naturel, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Δ	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	818	1,7	(1,6 - 1,8)	(-)	0,3	(0,3 - 0,3)	2,9	(2,9 - 2,9)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017;

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(-)	%		%	
Population ayant une identité autochtone	760	0,8	(-)	2,2		2,3	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Fécondité, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		IC	(-)	(+)	IC		IC	
Nombre moyen de naissances	947							
Indice synthétique de fécondité		1,82		(+)	1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,4	(28,3 - 28,5)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		50,5	(49,1 - 52,0)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	20	7,9	(6,5 - 9,6)	ns	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	178	69,1	(64,7 - 73,8)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	381	155,3	(148,5 - 162,5)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	269	96,8	(91,7 - 102,1)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	88	30,5	(27,8 - 33,5)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	12	4,5	(3,5 - 5,8)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Conditions socioculturelles

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(-)	%		%	
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	9 875						
% familles biparentales	7 505	76,0	(+)	72,5		75,4	
% familles monoparentales	2 370	24,0	(-)	27,5		24,6	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(-)	%		%	
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	3 865	20,8	(-)	24,0		21,4	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de la population en ménage privé de 15 ans et plus vivant seule, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population vivant seule	13 910	18,2	(+)	19,8	17,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Conditions socioéconomiques**Scolarité des 25-64 ans, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Plus haut diplôme atteint					
Population de 25 à 64 ans	48 730				
Inférieur au certificat d'études secondaires	9 375	19,2	(+)	16,6	13,3
Certificat d'études secondaires seulement	9 080	18,6	ns	19,0	18,5
Études postsecondaires inférieures au bacc.	23 985	49,2	(+)	49,1	42,7
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	6 290	12,9	(-)	15,3	25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Taux d'emploi, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Taux d'emploi	46 115	60,3	(+)	55,6	59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Taux de chômage, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Taux de chômage	2 800	5,7	(-)	7,1	7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	8 310	9,0	(-)	11,5	13,0
Hommes	3 995	8,6	(-)	10,8	12,4
Femmes	4 320	9,4	(-)	12,2	13,7
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	5 050	5,5	(-)	7,1	9,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Taux de prestataires d'assistance sociale, 2018									
	RLS				Région		Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)	4 221	5,6	(5,5 - 5,8)	(-)	7,9	(7,8 - 8,0)	5,9	(5,9 - 5,9)	
<i>Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire, 2018</i>									

Proportion de la population de 65 ans et plus en ménage privé bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016									
	RLS				Région		Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Taux de bénéficiaires	8 715	49,4	(+)		47,1		39,0		
<i>Source : Statistique Canada, recensement du Canada, 2016</i>									

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2015-2016									
	RLS				Région		Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Sécurité alimentaire	N/D	93,6			93,6	(92,0 - 94,9)	92,6	(92,1 - 93,2)	
Insécurité alimentaire modérée	N/D	4,0			4,0	(3,0 - 5,4)	4,9	(4,5 - 5,4)	
Insécurité alimentaire grave	N/D	* 2,4			* 2,4	(1,6 - 3,5)	2,4	(2,1 - 2,8)	
<i>Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)</i>									

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015											
	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC	% ajusté		IC	
Très satisfaits de sa vie sociale	38 600	48,6	(43,3 - 53,9)	ns	48,6	(43,3 - 53,9)	ns	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)
<i>Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015</i>											

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010									
	RLS				Région		Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4			9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)	
<i>Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)</i>									

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2015-2016									
	RLS				Région		Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC	
Très faible sentiment d'appartenance	N/D	6,6			6,6	(5,3 - 8,2)	8,8	(8,2 - 9,4)	
<i>Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)</i>									

Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Vulnérables dans au moins un domaine	260	23,2	(20,7 - 26,0)	(-)	26,0	(24,8 - 27,3)	27,7	(27,3 - 28,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

État de santé globale
Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC
Excellente ou très bonne santé	45 000	56,7	(51,5 - 61,7)	ns	56,5	(51,4 - 61,5)	56,6	(54,4 - 58,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	7 500	*9,5	(7,0 - 12,8)	ns	9,9	(7,3 - 13,2)	10,6	(9,4 - 12,0)
Population de 65 ans et plus	3 600	*21,0	(13,4 - 31,5)	ns			18,5	(15,4 - 22,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Espérance de vie à la naissance, 2012-2016

	RLS			Région		Québec	
	Esp. de vie	IC		Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	79,9	(79,3 - 80,4)	ns	79,6	(79,4 - 79,9)	80,3	(80,3 - 80,4)
Féminin	84,3	(83,7 - 84,9)	ns	83,9	(83,6 - 84,1)	84,3	(84,2 - 84,3)
Total	82,1	(81,7 - 82,5)	ns	81,8	(81,6 - 82,0)	82,4	(82,3 - 82,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006

	RLS			Région		Québec	
	Esp. de vie	IC		Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	66,8	(66,2 - 67,4)	ns	66,2	(66,0 - 66,5)	66,4	(66,3 - 66,5)
Féminin	68,9	(68,3 - 69,4)	(+)	68,4	(68,2 - 68,6)	68,2	(68,2 - 68,3)
Total	67,8	(67,4 - 68,3)	(+)	67,3	(67,1 - 67,5)	67,3	(67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	4	* 4,1	(2,7 - 6,4)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	5	* 5,5	(3,8 - 8,1)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant un médecin de famille	N/D	87,8	(84,0 - 91,4)	(+)	84,7	(83,0 - 86,3)	78,7	(78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

SANTÉ PHYSIQUE

Conditions démographiques

Fécondité, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	IC			IC	IC	IC	
Nombre moyen de naissances	947							
Indice synthétique de fécondité		1,82	(+)		1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,4	(28,3 - 28,5)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		50,5	(49,1 - 52,0)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	20	7,9	(6,5 - 9,6)	ns	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	178	69,1	(64,7 - 73,8)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	381	155,3	(148,5 - 162,5)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	269	96,8	(91,7 - 102,1)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	88	30,5	(27,8 - 33,5)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	12	4,5	(3,5 - 5,8)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux d'IVG	N/D	8,6	8,6	(8,3 - 8,9)	12,6	(12,5 - 12,7)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

Taux pour 10 000 personnes	RLS				Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%		
Total des hospitalisations	9 405	887,9	(874,1 - 902,0)	(+)	100,0	854,3	(848,4 - 860,2)	100,0	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0	
Tumeurs	735	65,8	(62,2 - 69,6)	ns	7,8	57,6	(56,2 - 59,1)	7,3	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5	
Maladies de l'appareil circulatoire	1 643	139	(133,9 - 144,3)	(+)	17,5	117,7	(115,7 - 119,8)	15,9	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4	
Maladies de l'appareil respiratoire	1 175	104,2	(99,7 - 108,9)	(+)	12,5	101,8	(99,8 - 103,8)	12,7	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1	
Maladies de l'appareil digestif	830	78,7	(74,7 - 83,0)	ns	8,8	78,0	(76,2 - 79,8)	9,2	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8	
Lésions traumatiques et empoisonnements	803	74,7	(70,8 - 78,8)	(+)	8,5	76,8	(75,1 - 78,6)	9,2	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1	
Grossesse, accouchements et puerpéralité	936	115,2	(109,8 - 121,0)	ns	10,0	113,2	(110,8 - 115,6)	10,3	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4	

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%			
Population ayant une incapacité	11 530	12,9	(-)	14,2	13,9

Source : Statistique Canada, *totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC*

Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région	Québec		
	Nbre	Taux	IC					
0-4 ans	4	* 85,5	(56,3 - 129,9)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	2	** 16,4	(8,2 - 32,9)	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	5	* 50,3	(34,5 - 73,3)	(+)	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	20	88,9	(73,0 - 108,2)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	125	443,1	(409,6 - 479,2)	ns	448,0	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	149	1 370,0	(1 275,1 - 1 472,0)	ns	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	504	6 346,4	(6 103,3 - 6 599,1)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	809	852,3	(826,4 - 879,0)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	809	730,1	(707,8 - 753,0)	ns	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, *Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017*

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	273	245,7	(232,9 - 259,2)	ns	287,2	(272,3 - 302,9)	(+)	244,4	(238,9 - 249,9)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	192	171,9	(161,3 - 183,1)	ns	202,3	(189,9 - 215,5)	(+)	177,1	(172,5 - 181,8)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	95	83,2	(76,0 - 91,0)	(+)	99,7	(91,1 - 109,1)	(+)	85,0	(81,8 - 88,2)	73,1	(72,3 - 73,9)
Traumatismes non intentionnels	32	31,3	(26,7 - 36,6)	ns	33,5	(28,7 - 39,1)	ns	31,3	(29,3 - 33,4)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	32	29,2	(25,0 - 34,1)	ns	33,7	(28,9 - 39,4)	(+)	29,9	(28,0 - 31,9)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	16	14,3	(11,5 - 17,8)	(-)	16,9	(13,5 - 21,0)	(-)	19,4	(17,9 - 21,0)	23,8	(23,3 - 24,3)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	14	12,3	(9,7 - 15,5)	ns	14,5	(11,5 - 18,4)	ns	14,9	(13,6 - 16,2)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, *Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017*

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région	Québec		
	Nbre	%	IC					
Surpoids	42 300	55,8	(50,6 - 60,9)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	14 600	19,3	(15,7 - 23,5)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, *Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015*

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Migraines (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,3 - 8,4)	9,0	(8,4 - 9,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Hommes	N/D	** 1,1	** 1,1	(0,5 - 2,5)	2,9	(2,3 - 3,7)
Femmes	N/D	* 14,0	* 14,0	(10,3 - 18,7)	12,1	(11,2 - 13,1)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence des cardiopathies ischémiques	7 600	7,3	(7,1 - 7,5)	(-)	10,2	(9,9 - 10,5)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 290	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	3,1	(2,9 - 3,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	(-)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'asthme	6 940	7,7	(7,5 - 8,0)	(-)	7,4	(7,2 - 7,6)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	ns	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	6 075	8,4	(8,1 - 8,7)	ns	10,4	(10,0 - 10,7)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté				
Prévalence de l'hypertension	19 140	19,0	(18,6 - 19,3)	(-)	25,7	(25,2 - 26,1)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté				
Prévalence du diabète	7 080	7,1	(6,8 - 7,3)	(-)	9,5	(9,2 - 9,8)	ns	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté				
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	537	577,9	(556,5 - 600,2)	ns	588,4	(566,5 - 611,1)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	76	81,4	(73,6 - 90,0)	ns	83,0	(75,1 - 91,8)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	14,5	(11,4 - 18,4)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	9	9,4	(7,0 - 12,7)	ns	9,6	(7,2 - 13,0)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	79	84,9	(76,9 - 93,7)	(-)	86,7	(78,6 - 95,7)	ns	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	59	121,9	(108,7 - 136,7)	(-)	130,0	(116,0 - 145,6)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	81	191,5	(173,7 - 211,2)	(+)	177,5	(161,0 - 195,6)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	12	13,1	(10,2 - 16,8)	ns	13,4	(10,4 - 17,2)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	27	29,4	(24,9 - 34,8)	ns	30,0	(25,4 - 35,5)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	11	12,0	(9,3 - 15,6)	ns	12,3	(9,4 - 15,9)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	21	22,4	(18,5 - 27,1)	ns	22,8	(18,8 - 27,6)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté				
Tumeurs du côlon, rectum et anus	31	28,1	(24,0 - 32,8)	ns	33,1	(28,3 - 38,7)	ns	28,5	(26,7 - 30,5)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	5	* 4,7	(3,2 - 6,9)	ns	* 5,5	(3,7 - 8,0)	ns	5,9	(5,1 - 6,9)	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	15	13,8	(11,0 - 17,3)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	14,0	(12,8 - 15,4)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	12	24,9	(19,3 - 32,2)	ns	25,2	(19,5 - 32,4)	ns	22,4	(20,0 - 25,1)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	14	24,0	(19,0 - 30,5)	ns	29,6	(23,4 - 37,4)	ns	23,4	(21,1 - 25,9)	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	87	77,8	(70,7 - 85,5)	ns	91,2	(83,0 - 100,2)	(+)	78,4	(75,3 - 81,5)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	10	8,4	(6,4 - 11,2)	ns	10,3	(7,8 - 13,7)	ns	8,1	(7,2 - 9,2)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	12	10,5	(8,1 - 13,6)	ns	12,2	(9,4 - 15,8)	(+)	9,6	(8,6 - 10,8)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté				
Cardiopathies ischémiques	86	76,5	(69,6 - 84,1)	ns	90,2	(82,0 - 99,1)	ns	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	50	45,3	(40,0 - 51,2)	ns	53,1	(46,9 - 60,1)	(+)	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	37	33,0	(28,5 - 38,1)	ns	39,0	(33,7 - 45,0)	ns	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	8	7,0	(5,1 - 9,5)	ns	8,2	(6,0 - 11,2)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Grippe et pneumopathie	30	26,5	(22,6 - 31,1)	(+)	31,6	(26,9 - 37,1)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	49	42,8	(37,7 - 48,5)	(+)	51,4	(45,4 - 58,3)	(+)	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Maladies du foie	10	9,2	(7,0 - 12,2)	ns	10,5	(8,0 - 13,9)	ns	9,9	(8,8 - 11,0)	9,2	(8,9 - 9,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Insuffisance rénale	9	7,6	(5,7 - 10,3)	ns	9,1	(6,7 - 12,2)	ns	9,5	(8,5 - 10,6)	10,1	(9,8 - 10,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	49	5,2	(4,5 - 5,8)	(-)	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)	

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances prématurées	64	6,8	(6,0 - 7,5)	ns	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)	

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013 à 2017

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	69	7,6	(6,8 - 8,3)	(-)	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)	

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	4	* 4,1	(2,7 - 6,4)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)	

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012 à 2016

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	5	* 5,5	(3,8 - 8,1)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)	

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	7 900	* 10,0	(7,2 - 13,6)	ns	* 9,9	(7,2 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	23 400	32,2	(27,2 - 36,9)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)		30,3			(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	495	101,5	(89,9 - 114,2)	ns	104,6	(92,9 - 117,3)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	11	11,8	(9,1 - 15,4)	(+)	11,8	(9,1 - 15,3)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	9,7	(7,3 - 13,0)	(+)	9,7	(7,3 - 12,9)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	12,0	(9,4 - 15,3)	ns	14,1	(11,1 - 17,9)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	8	7,6	(5,6 - 10,3)	ns	8,8	(6,5 - 12,0)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	5	* 4,4	(3,0 - 6,5)	ns	* 5,3	(3,6 - 7,8)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				64,8	(50,5 - 83,3)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	622	57,5	(54,8 - 60,2)	(+)	65,1	(62,2 - 68,2)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	62	6,4	(5,5 - 7,4)	(+)	6,5	(5,6 - 7,5)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	406	35,0	(33,0 - 37,1)	(+)	42,6	(40,2 - 45,1)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	64	7,0	(6,0 - 8,1)	(+)	6,7	(5,8 - 7,8)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

État de santé physique - maladies infectieuses

Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	309	320,1	(286,3 - 357,9)	ns	368,2	(352,0 - 385,1)		316,5			(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin	N/D	72,7	(68,1 - 77,5)	ns	75,7	(73,9 - 77,5)	75,0	(74,5 - 75,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit	N/D	* 6,9	(3,7 - 10,3)	(-)	9,5	(7,9 - 11,1)	11,0	(10,6 - 11,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un spécialiste à la suite d'une référence	N/D	24,2	(19,5 - 28,8)	(-)	27,6	(25,7 - 29,5)	30,5	(30,0 - 31,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	11,3	(7,9 - 14,6)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	30,6	(25,6 - 35,6)	ns	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

SANTÉ PUBLIQUE

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Conditions socioéconomiques

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	700	* 15,9	(10,7 - 22,9)	ns	20,3	(17,7 - 23,2)	17,5	(16,8 - 18,3)
Garçons	400	* 19,0	(13,0 - 26,8)	ns	25,0	(21,6 - 28,7)	21,3	(20,3 - 22,3)
Filles	300	** 12,7	(7,6 - 20,5)	ns	15,4	(12,9 - 18,2)	13,6	(12,8 - 14,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Taux annuel d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (RLS de résidence), 2011-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	102	11,3	(10,1 - 12,5)	(-)	15,5	(14,9 - 16,1)	15,2	(15,1 - 15,4)
Garçons	64	14,9	(13,0 - 16,8)	(-)	19,4	(18,5 - 20,4)	18,7	(18,4 - 18,9)
Filles	38	8,0	(6,6 - 9,4)	(-)	11,9	(11,1 - 12,6)	12,0	(11,8 - 12,2)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MEES)

Environnement physique

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Exposition fumée secondaire	N/D	* 6,2	* 6,2	(4,5 - 8,3)	4,8	(4,3 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Logements avec réparations majeures	2 055	4,9	(-)	6,0		6,4	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fortement dérangé par le bruit à domicile	8 100	10,2	(7,5 - 13,6)	(-)	12,6	(11,2 - 14,2)	16,4	(15,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	1 500	32,9	(29,1 - 36,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes	N/D	60,6	60,6	(57,5 - 63,6)	61,4	(60,5 - 62,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Nombre de portions minimales de fruits et légumes	900	20,6	(17,3 - 24,3)	(-)	22,6	(20,8 - 24,5)	25,6	(24,9 - 26,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC	% ajusté	IC			
Au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou p	18 300	23,1	(18,9 - 27,9)	ns	22,8	(18,6 - 27,7)	ns	22,7	(20,9 - 24,6)	19,0	(18,6 - 19,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif	N/D	37,2	37,2	(33,2 - 41,1)	40,1	(39,0 - 41,3)
12-17 ans, très actifs	N/D	np	np	-----	43,5	(39,4 - 47,5)
Garçons	N/D	np	np	-----	51,0	(45,4 - 56,6)
Filles	N/D	np	np	-----	35,4	(29,7 - 41,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

np : du fait d'un fort coefficient de variation, la donnée régionale n'est pas présentée

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	1 300	29,1	(24,7 - 33,8)			32,4	(29,8 - 35,1)	31,8	(31,0 - 32,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté		IC	% ajusté	IC	
Fumeurs actuels	14 500	18,3	(14,5 - 22,8)	18,4		19,6	(17,8 - 21,4)	19,3	(18,8 - 19,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2015-2016

	RLS		ns	Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Entre 5 et 11 ans	N/D	** 3,0		** 3,0	(1,3 - 6,8)	1,7	(1,3 - 2,2)
Entre 12 et 14 ans	N/D	* 14,4		* 14,4	(10,2 - 20,1)	15,9	(14,2 - 17,8)
Entre 15 et 19 ans	N/D	61,1		61,1	(52,6 - 69,0)	53,7	(51,1 - 56,3)
20 ans et plus	N/D	* 21,5		* 21,5	(15,7 - 28,7)	28,7	(26,3 - 31,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Fumeurs actuels	200	** 3,9	(2,1 - 7,0)			4,7	(3,7 - 5,9)	3,1	(2,8 - 3,3)
Fumeurs débutants	100	* 2,6	(1,7 - 3,8)			2,7	(2,1 - 3,3)	2,4	(2,2 - 2,6)
Non-Fumeurs	4 600	93,6	(90,3 - 95,8)			92,7	(91,2 - 93,9)	94,6	(94,2 - 94,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				(+)	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Consommation excessive d'alcool	2 400	52,2	(46,7 - 57,6)			45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				(+)	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Consommation actuelle de cannabis	1 000	22,7	(19,1 - 26,8)			22,5	(20,7 - 24,4)	18,2	(17,6 - 18,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	42 100	72,8	(66,9 - 78,1)			75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	19 700	62,7	(54,4 - 70,2)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	10 744	78,4	(77,5 - 79,3)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	64 000	84,4	(79,8 - 88,1)	ns	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de cyclistes portant un casque à bicyclette, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Port du casque	N/D	29,3	29,3	(23,9 - 34,7)	42,4	(40,7 - 44,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Non-utilisation de la ceinture	N/D	10,8	10,8		9,9	

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329	329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

État de santé globale

Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	4	* 85,5	(56,3 - 129,9)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	2	** 16,4	(8,2 - 32,9)	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	5	* 50,3	(34,5 - 73,3)	(+)	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	20	88,9	(73,0 - 108,2)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	125	443,1	(409,6 - 479,2)	ns	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	149	1 370,0	(1 275,1 - 1 472,0)	ns	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	504	6 346,4	(6 103,3 - 6 599,1)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	809	852,3	(826,4 - 879,0)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	809	730,1	(707,8 - 753,0)	ns	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	273	245,7	(232,9 - 259,2)	ns	287,2	(272,3 - 302,9)	244,4	(238,9 - 249,9)
Maladies de l'appareil circulatoire	192	171,9	(161,3 - 183,1)	ns	202,3	(189,9 - 215,5)	177,1	(172,5 - 181,8)
Maladies de l'appareil respiratoire	95	83,2	(76,0 - 91,0)	(+)	99,7	(91,1 - 109,1)	85,0	(81,8 - 88,2)
Maladies du système nerveux	71	63,3	(57,0 - 70,2)	(+)	74,8	(67,4 - 83,0)	59,9	(57,2 - 62,6)
Troubles mentaux et du comportement	32	28,4	(24,4 - 33,2)	(-)	33,9	(29,1 - 39,6)	37,1	(35,1 - 39,3)
Traumatismes non intentionnels	32	31,3	(26,7 - 36,6)	ns	33,5	(28,7 - 39,1)	31,3	(29,3 - 33,4)
Maladies de l'appareil digestif	32	29,2	(25,0 - 34,1)	ns	33,7	(28,9 - 39,4)	29,9	(28,0 - 31,9)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	16	14,3	(11,5 - 17,8)	(-)	16,9	(13,5 - 21,0)	19,4	(17,9 - 21,0)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	16	14,6	(11,8 - 18,2)	ns	17,3	(13,9 - 21,5)	15,4	(14,1 - 16,8)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	14	12,3	(9,7 - 15,5)	ns	14,5	(11,5 - 18,4)	14,9	(13,6 - 16,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Population édentée	9 100	11,5	(9,1 - 14,5)	ns	11,4	(8,9 - 14,6)	13,8	(12,6 - 15,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	42 300	55,8	(50,6 - 60,9)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	14 600	19,3	(15,7 - 23,5)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	2 900	** 3,9	(2,3 - 6,6)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	19 140	19,0	(18,6 - 19,3)	(-)	25,7	(25,2 - 26,1)	(+)	19,1 (19,0 - 19,3)	19,8 (19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	45				0,2	(0,2 - 0,3)	ns	0,3 (0,2 - 0,3)	0,3 (0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	7 080	7,1	(6,8 - 7,3)	(-)	9,5	(9,2 - 9,8)	ns	7,6 (7,5 - 7,7)	8,0 (7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	537	577,9	(556,5 - 600,2)	ns	588,4	(566,5 - 611,1)	(+)	563,8 (554,8 - 572,9)	572,6 (570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	76	81,4	(73,6 - 90,0)	ns	83,0	(75,1 - 91,8)	(+)	75,1 (71,9 - 78,5)	74,8 (73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	14,5	(11,4 - 18,4)	ns	13,9 (12,5 - 15,4)	14,9 (14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	9	9,4	(7,0 - 12,7)	ns	9,6	(7,2 - 13,0)	ns	9,4 (8,3 - 10,6)	11,0 (10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	79	84,9	(76,9 - 93,7)	(-)	86,7	(78,6 - 95,7)	ns	102,2 (98,5 - 106,1)	98,6 (97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	59	121,9	(108,7 - 136,7)	(-)	130,0	(116,0 - 145,6)	ns	126,8 (120,9 - 132,9)	137,4 (135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	81	191,5	(173,7 - 211,2)	(+)	177,5	(161,0 - 195,6)	(+)	136,7 (130,2 - 143,5)	131,0 (129,3 - 132,8)
Cancer du rein	12	13,1	(10,2 - 16,8)	ns	13,4	(10,4 - 17,2)	ns	16,9 (15,4 - 18,5)	17,2 (16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	27	29,4	(24,9 - 34,8)	ns	30,0	(25,4 - 35,5)	ns	31,1 (29,0 - 33,2)	30,7 (30,2 - 31,3)
Leucémies	11	12,0	(9,3 - 15,6)	ns	12,3	(9,4 - 15,9)	ns	13,3 (12,0 - 14,7)	14,6 (14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	21	22,4	(18,5 - 27,1)	ns	22,8	(18,8 - 27,6)	ns	20,3 (18,7 - 22,1)	21,2 (20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	31	28,1	(24,0 - 32,8)	ns	33,1	(28,3 - 38,7)	ns	28,5 (26,7 - 30,5)	28,7 (28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	5	* 4,7	(3,2 - 6,9)	ns	* 5,5	(3,7 - 8,0)	ns	5,9 (5,1 - 6,9)	6,4 (6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	15	13,8	(11,0 - 17,3)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	14,0 (12,8 - 15,4)	13,7 (13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	12	24,9	(19,3 - 32,2)	ns	25,2	(19,5 - 32,4)	ns	22,4 (20,0 - 25,1)	23,8 (23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	14	24	(19,0 - 30,5)	ns	29,6	(23,4 - 37,4)	ns	23,4 (21,1 - 25,9)	28,7 (28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	87	77,8	(70,7 - 85,5)	ns	91,2	(83,0 - 100,2)	(+)	78,4 (75,3 - 81,5)	72,6 (71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	10	8,4	(6,4 - 11,2)	ns	10,3	(7,8 - 13,7)	ns	8,1 (7,2 - 9,2)	7,9 (7,6 - 8,1)
Leucémie	12	10,5	(8,1 - 13,6)	ns	12,2	(9,4 - 15,8)	(+)	9,6 (8,6 - 10,8)	8,7 (8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	86	76,5	(69,6 - 84,1)	ns	90,2	(82,0 - 99,1)	ns	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	50	45,3	(40,0 - 51,2)	ns	53,1	(46,9 - 60,1)	(+)	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	37	33,0	(28,5 - 38,1)	ns	39,0	(33,7 - 45,0)	ns	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	8	7,0	(5,1 - 9,5)	ns	8,2	(6,0 - 11,2)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	30	26,5	(22,6 - 31,1)	(+)	31,6	(26,9 - 37,1)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	49	42,8	(37,7 - 48,5)	(+)	51,4	(45,4 - 58,3)	(+)	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	49	5,2	(4,5 - 5,8)	(-)	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	69	7,6	(6,8 - 8,3)	(-)	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC		Région		Québec	
								% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	7 900	* 10,0	(7,2 - 13,6)	ns	* 9,9	(7,2 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2017

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	11	11,8	(9,1 - 15,4)	(+)	11,8	(9,1 - 15,3)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	9,7	(7,3 - 13,0)	(+)	9,7	(7,3 - 12,9)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	12,0	(9,4 - 15,3)	ns	14,1	(11,1 - 17,9)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	8	7,6	(5,6 - 10,3)	ns	8,8	(6,5 - 12,0)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	5	* 4,4	(3,0 - 6,5)	ns	* 5,3	(3,6 - 7,8)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				64,8	(50,5 - 83,3)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	622	57,5	(54,8 - 60,2)	(+)	65,1	(62,2 - 68,2)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	62	6,4	(5,5 - 7,4)	(+)	6,5	(5,6 - 7,5)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	406	35,0	(33,0 - 37,1)	(+)	42,6	(40,2 - 45,1)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	308				157,3	(147,3 - 167,9)	(+)	153,3	(150,0 - 156,6)	134,3	(133,5 - 135,2)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	64	7,0	(6,0 - 8,1)	(+)	6,7	(5,8 - 7,8)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

État de santé physique - maladies infectieuses
Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	RLS				Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC		Taux	IC	
Taux d'incidence pour 100 000	309	320,1	(286,3 - 357,9)	ns	368,2	(352,0 - 385,1)		316,5	(312,7 - 320,3)	

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

État de santé psychosociale ou mentale
Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0		30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	5 700	* 11,3	(7,7 - 16,2)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS					Région		Québec			
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Population de 15 ans et plus	21 600	27,2	(22,7 - 32,3)	ns	27,9	(23,2 - 33,0)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	8 700	* 21,5	(15,8 - 28,6)	ns	* 20,9	(15,3 - 28,0)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	12 800	32,9	(26,6 - 39,9)	ns	33,7	(27,2 - 40,8)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 200	25,9	(22,1 - 30,1)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 000	** 1,3	(0,5 - 3,0)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS					Région		Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Mortalité par suicide	14	15,2	(12,0 - 19,1)	ns	15,2	(12,0 - 19,1)	ns	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7583,5		7583,5	(7304,8 - 7872,9)	6090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP)

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

SERVICES GÉNÉRAUX

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	42 100	72,8	(66,9 - 78,1)	ns	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	19 700	62,7	(54,4 - 70,2)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique	10 744	78,4	(77,5 - 79,3)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	64 000	84,4	(79,8 - 88,1)	ns	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	42 300	55,8	(50,6 - 60,9)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	14 600	19,3	(15,7 - 23,5)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +)	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence des cardiopathies ischémiques	7 600	7,3	(7,1 - 7,5)	(-)	10,2	(9,9 - 10,5)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'asthme	6 940	7,7	(7,5 - 8,0)	(-)	7,4	(7,2 - 7,6)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Prévalence de la MPOC	6 075	8,4	(8,1 - 8,7)	ns	10,4	(10,0 - 10,7)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'hypertension	19 140	19,0	(18,6 - 19,3)	(-)	25,7	(25,2 - 26,1)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	45				0,2	(0,2 - 0,3)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	7 080	7,1	(6,8 - 7,3)	(-)	9,5	(9,2 - 9,8)	ns	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	537	577,9	(556,5 - 600,2)	ns	588,4	(566,5 - 611,1)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	76	81,4	(73,6 - 90,0)	ns	83,0	(75,1 - 91,8)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	14,5	(11,4 - 18,4)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	9	9,4	(7,0 - 12,7)	ns	9,6	(7,2 - 13,0)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	79	84,9	(76,9 - 93,7)	(-)	86,7	(78,6 - 95,7)	ns	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	59	121,9	(108,7 - 136,7)	(-)	130,0	(116,0 - 145,6)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	81	191,5	(173,7 - 211,2)	(+)	177,5	(161,0 - 195,6)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	12	13,1	(10,2 - 16,8)	ns	13,4	(10,4 - 17,2)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	27	29,4	(24,9 - 34,8)	ns	30,0	(25,4 - 35,5)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	11	12,0	(9,3 - 15,6)	ns	12,3	(9,4 - 15,9)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	21	22,4	(18,5 - 27,1)	ns	22,8	(18,8 - 27,6)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	49	5,2	(4,5 - 5,8)	(-)	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances prématurées	64	6,8	(6,0 - 7,5)	ns	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	69	7,6	(6,8 - 8,3)	(-)	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	7 900	* 10,0	(7,2 - 13,6)	ns	* 9,9	(7,2 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	RLS	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs	9 000	* 11,4	(8,5 - 15,1)	ns	11,4	(8,6 - 15,0)	ns	10,4	(9,0 - 11,9)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	RLS	% brut	IC	ns	% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	23 400	32,2	(27,2 - 36,9)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)	ns	30,3	(29,6 - 31,1)		

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

État de santé psychosociale ou mentale

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	RLS	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	9 750	10,2	(10,0 - 10,5)	(-)	10,4	(10,1 - 10,7)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	5 375	5,7	(5,5 - 5,9)	(-)	5,7	(5,5 - 5,9)	(-)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	290	0,3	(0,3 - 0,4)	(-)	0,3	(0,3 - 0,4)	(-)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région				Québec		
	Nbre	%	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	ns	24,1	(23,3 - 25,1)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	5 700	* 11,3	(7,7 - 16,2)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	ns	11,7	(11,2 - 12,3)		

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	21 600	27,2	(22,7 - 32,3)	ns	27,9	(23,2 - 33,0)	26,0	(24,1 - 28,1)
Hommes	8 700	* 21,5	(15,8 - 28,6)	ns	* 20,9	(15,3 - 28,0)	21,1	(18,6 - 23,8)
Femmes	12 800	32,9	(26,6 - 39,9)	ns	33,7	(27,2 - 40,8)	30,7	(27,8 - 33,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 200	25,9	(22,1 - 30,1)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 000	** 1,3	(0,5 - 3,0)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	14	15,2	(12,0 - 19,1)	ns	15,2	(12,0 - 19,1)	16,9	(15,3 - 18,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 100 000 femmes	N/D	386,0	386,0	(374,3 - 398,0)	417,2	(414,1 - 420,3)

Source: Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Expérience de soins
Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	11,3	(7,9 - 14,6)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	* 8,8	5,8 - 12,1	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		2,8	2,1	4,0
65 ans et +		21,4	18,6	18,2
65-74 ans		20,6	19,0	17,7
75-84 ans		22,5	17,9	18,0
85 ans et plus		22,8	19,1	21,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	2 376	2,4	2,0	3,6
65 ans et +	4 236	18,6	17,6	17,8
75 ans et plus	2 766	28,5	24,5	24,3

Conditions socioculturelles

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	17 640	86,4	(-)	87,3

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de personnes de 65 ans et plus en ménage privé vivant seules, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Personnes de 65 ans et plus vivant seules	4 880	27,7	(-)	31,1

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Environnement social

Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population prodiguant soins aux âgés	13 925	19,1	(+)	21,7		18,6	

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	N/D	* 15,6		* 15,6	(11,7 - 20,2)	12,2	(11,4 - 13,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESSC)

État de santé globale

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brute	IC	ns	% ajustée	IC	ns	% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	7 500	*9,5	(7,0 - 12,8)	ns	9,9	(7,3 - 13,2)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	3 600	*21,0	(13,4 - 31,5)	ns				18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(-)	%		%	
Population ayant une incapacité	11 530	12,9	(-)	14,2		13,9	
65 ans et plus	4 365	31,4	(-)	33,3		36,8	
65-74 ans	2 055	23,4	(-)	24,5		27,2	
75 ans et +	2 310	45,2	(-)	47,3		51,4	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut		% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9		8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)
65 ans et +	N/D	24,0		24,0	(18,3 - 29,8)	19,6	(17,9 - 21,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESSC)

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Maladies du système nerveux	71	63,3	(57,0 - 70,2)	(+)	74,8	(67,4 - 83,0)	(+)	59,9	(57,2 - 62,6)	48,5	(47,9 - 49,2)
Maladie d'Alzheimer	49	42,9	(37,9 - 48,7)	(+)	51,4	(45,4 - 58,3)	(+)	39,1	(37,0 - 41,3)	27,3	(26,8 - 27,8)
Troubles mentaux et du comportement	32	28,4	(24,4 - 33,2)	(-)	33,9	(29,1 - 39,6)	(-)	37,1	(35,1 - 39,3)	41,7	(41,1 - 42,3)
Troubles mentaux organiques, incluent les troubles symptomatiques	30	26,4	(22,5 - 31,0)	(-)	31,6	(26,9 - 37,1)	(-)	34,3	(32,3 - 36,3)	38,9	(38,4 - 39,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
45-64 ans	3 300	* 11,8	(7,5 - 18,0)	ns	13,9	(11,7 - 16,3)	9,0	(8,6 - 9,6)
65 ans et plus	6 000	35,4	(26,4 - 45,7)	ns	41,9	(37,7 - 46,2)	33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques
Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	2 900	** 3,9	(2,3 - 6,6)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	N/D	40,5	40,5	(35,5 - 45,7)	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
65 ans et plus	N/D	13,5	13,5	(10,3 - 17,4)	15,5	(14,2 - 16,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 290	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	3,1	(2,9 - 3,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	1 735	8,7	(8,2 - 9,3)	ns	8,5	(8,0 - 9,0)	ns	9,2	(9,0 - 9,5)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	6 075	8,4	(8,1 - 8,7)	ns	10,4	(10,0 - 10,7)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	3 910	19,8	(19,0 - 20,6)	ns	19,8	(19,0 - 20,6)	ns	19,5	(19,2 - 19,9)	19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	537	577,9	(556,5 - 600,2)	ns	588,4	(566,5 - 611,1)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	76	81,4	(73,6 - 90,0)	ns	83,0	(75,1 - 91,8)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	14,5	(11,4 - 18,4)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	9	9,4	(7,0 - 12,7)	ns	9,6	(7,2 - 13,0)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	79	84,9	(76,9 - 93,7)	(-)	86,7	(78,6 - 95,7)	ns	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	59	121,9	(108,7 - 136,7)	(-)	130,0	(116,0 - 145,6)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	81	191,5	(173,7 - 211,2)	(+)	177,5	(161,0 - 195,6)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	12	13,1	(10,2 - 16,8)	ns	13,4	(10,4 - 17,2)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	27	29,4	(24,9 - 34,8)	ns	30,0	(25,4 - 35,5)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	11	12,0	(9,3 - 15,6)	ns	12,3	(9,4 - 15,9)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	21	22,4	(18,5 - 27,1)	ns	22,8	(18,8 - 27,6)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	9 750	10,2	(10,0 - 10,5)	(-)	10,4	(10,1 - 10,7)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
65 ans et plus	2 450	-----	-----		12,4	(11,8 - 13,1)	(-)	13,1	(12,9 - 13,4)	13,7	(13,6 - 13,8)
65 ans et + (troubles anxiodépressif)	1 220	-----	-----		6,2	(5,7 - 6,6)	(-)	6,2	(6,0 - 6,4)	7,3	(7,2 - 7,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

N. B. l'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 65 ans et plus	1 360	6,5	(6,0 - 7,0)	ns	6,9	(6,4 - 7,4)	(-)	7,2	(7,0 - 7,5)	6,8	(6,7 - 6,9)
65-74 ans	185	-----	-----		1,6	(1,3 - 1,9)	ns	1,9	(1,7 - 2,0)	1,7	(1,6 - 1,7)
75-84 ans	535	-----	-----		9,2	(8,2 - 10,3)	ns	10,2	(9,7 - 10,6)	9,5	(9,4 - 9,7)
85 ans et plus	645	-----	-----		25,8	(23,3 - 28,5)	ns	28,8	(27,7 - 30,0)	27,4	(27,1 - 27,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	495	101,5	(89,9 - 114,2)	ns	104,6	(92,9 - 117,3)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	250	128,7	(108,7 - 151,2)	ns	126,6	(106,9 - 148,7)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Chutes grand total	13	12,0	(9,4 - 15,3)	ns	14,1	(11,1 - 17,9)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	8	7,6	(5,6 - 10,3)	ns	8,8	(6,5 - 12,0)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	5	* 4,4	(3,0 - 6,5)	ns	* 5,3	(3,6 - 7,8)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				64,8	(50,5 - 83,3)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

DÉFICIENCE PHYSIQUE

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(-)	%		%	
Population ayant une incapacité	11 530	12,9	(-)	14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	% brut	% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9	8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de la population ayant une surdit , population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population ayant une surdit�	14 000	17,8	(14,5 - 21,7)	17,3	(14,0 - 21,2)	15,7	(13,9 - 14,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier ma tre de l'Enqu te qu bécoise sur la sant  de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région				Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)		
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 290	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	3,1	(2,9 - 3,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	7 900	* 10,0	(7,2 - 13,6)	ns	* 9,9	(7,2 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	ns	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	495	101,5	(89,9 - 114,2)	ns	104,6	(92,9 - 117,3)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	11	11,8	(9,1 - 15,4)	(+)	11,8	(9,1 - 15,3)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	9,7	(7,3 - 13,0)	(+)	9,7	(7,3 - 12,9)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	12,0	(9,4 - 15,3)	ns	14,1	(11,1 - 17,9)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	8	7,6	(5,6 - 10,3)	ns	8,8	(6,5 - 12,0)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	5	* 4,4	(3,0 - 6,5)	ns	* 5,3	(3,6 - 7,8)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				64,8	(50,5 - 83,3)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

DI-TED

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

État de santé mentale

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC				
Prévalence du trouble du spectre de l'autisme	160	0,6	(0,5 - 0,8)	(-)	0,7	(0,5 - 0,8)	(-)	0,9	(0,8 - 0,9)	1,2	(1,2 - 1,2)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

JEUNES EN DIFFICULTÉ

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	1 500	32,9	(29,1 - 36,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Violence infligée	500	23,0	(18,6 - 28,1)	ns	24,7	(22,6 - 27,0)	24,1	(23,3 - 25,0)
Violence subie	700	33,8	(30,0 - 37,8)	ns	36,6	(34,4 - 38,8)	36,2	(35,3 - 37,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un comportement d'agressivité directe	1 300	29,2	(25,4 - 33,3)	ns	30,7	(28,7 - 32,7)	33,1	(32,4 - 33,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un des trois problèmes	700	16,0	(13,4 - 19,1)	ns	19,9	(18,6 - 21,3)	19,5	(19,0 - 20,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 200	25,9	(22,1 - 30,1)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC				
Prévalence du TDA/H	765	3,1	(2,8 - 3,4)	(-)	3,2	(2,9 - 3,5)	(-)	4,8	(4,6 - 4,9)	4,2	(4,2 - 4,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	30,8	30,8	(30,3 - 31,3)	20,3	(20,2 - 20,4)

Source: Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	9,2	9,2	(8,9 - 9,5)	5,8	(5,7 - 5,8)

Source: Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7 583,5	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source: Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	1 200	27,3	(23,1 - 32,0)	(-)	29,7	(27,5 - 31,9)	32,6	(32,0 - 33,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017



Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

DÉPENDANCES

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois au cours d'une année, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus	N/D	21,4			21,4	(18,4 - 24,7)	21,2	(20,4 - 22,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	2 400	52,2	(46,7 - 57,6) (+)		45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total feux rouges et jaunes	400	8,1	ns		8,1		6,2	
En émergence (feux jaunes)	200	* 4,4	(2,9 - 6,7) ns		3,7	(3,2 - 4,4)	3,3	(3,1 - 3,5)
Problématique (feux rouges)	200	* 3,7	(2,3 - 5,9) ns		4,4	(3,6 - 5,3)	2,9	(2,7 - 3,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS						Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC
Consommateurs actuels de drogues	11 800	14,8	(11,3 - 19,2)		ns	15,3	(11,8 - 19,6)	ns	15,5	(13,8 - 17,3)
Cannabis seulement	10 500	13,2	(9,9 - 17,5)		ns	13,6	(10,2 - 17,9)	ns	14,1	(12,5 - 15,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Condammations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Tx p. 100 000		IC		Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Taux pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329				329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Participé à au moins un jeu de hasard et d'argent	N/D	70,4	70,4	(66,6 - 74,1)	63,8	(62,8 - 64,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS d'Arthabaska-et-de-l'Érable

SANTÉ MENTALE

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Très satisfaits de sa vie sociale	38 600	48,6	(43,3 - 53,9)	ns	48,6	(43,3 - 53,9)	ns	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	2 900	** 3,9	(2,3 - 6,6)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques de santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS			Région			Québec				
	Nbre	% ajusté	IC	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Ensemble des troubles mentaux	9 750	10,2	(10,0 - 10,5)	(-)	10,4	(10,1 - 10,7)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	5 375	5,7	(5,5 - 5,9)	(-)	5,7	(5,5 - 5,9)	(-)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	290	0,3	(0,3 - 0,4)	(-)	0,3	(0,3 - 0,4)	(-)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0	30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	5 700	* 11,3	(7,7 - 16,2)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté			
Population de 15 ans et plus	21 600	27,2	(22,7 - 32,3)	ns	27,9	(23,2 - 33,0)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	8 700	* 21,5	(15,8 - 28,6)	ns	* 20,9	(15,3 - 28,0)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	12 800	32,9	(26,6 - 39,9)	ns	33,7	(27,2 - 40,8)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 200	25,9	(22,1 - 30,1)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 000	** 1,3	(0,5 - 3,0)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'hospitalisation spécifique à une tentative de suicide, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des tentatives de suicide	67	7,0	(6,1 - 8,1)	(+)	7,5	(6,5 - 8,7)	(+)	6,5	(6,0 - 6,9)	4,5	(4,4 - 4,6)
Hommes	27	5,6	(4,5 - 7,0)	(+)	5,8	(4,6 - 7,3)	(+)	5,1	(4,6 - 5,6)	3,6	(3,5 - 3,7)
Femmes	40	8,4	(7,0 - 10,1)	(+)	9,4	(7,8 - 11,3)	(+)	7,9	(7,3 - 8,6)	5,5	(5,3 - 5,6)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	14	15,2	(12,0 - 19,1)	ns	15,2	(12,0 - 19,1)	ns	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins
Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	* 8,8	5,8 - 12,1	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	11,3	(7,9 - 14,6)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	30,6	(25,6 - 35,6)			31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Disponibilité géographique

RLS Réseau local de services
RSS Région sociosanitaire

Indicateurs

Incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental

Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue

feu jaune (14 à 19 points) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes en émergence de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention de première ligne est jugée
feu rouge (20 points et plus) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes évidents de consommation de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention spécialisée est

Tension au travail

La tension au travail est mesurée par l'exposition combinée à des exigences psychologiques élevées (en lien à la quantité de travail, aux exigences mentales et aux contraintes de temps auxquelles le travailleur doit faire face au travail) et à une autorité décisionnelle faible (peu de possibilité de choisir comment faire son travail et peu de participation aux décisions qui s'y rattachent).

Problèmes de santé de longue durée

Les problèmes de santé de longue durée correspondent aux problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus, diagnostiqués par

Sécurité alimentaire

Alimentation non précaire	sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
Alimentation modérément précaire	insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
Alimentation sévèrement précaire	insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).



*Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec*

Québec 

**CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE
LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC**

Centre administratif Bonaventure

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

www.ciusssmcq.ca