




# Un regard averti

sur l'état de santé de la population  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

Direction de santé publique  
Juin 2019

**ÉQUIPE SURVEILLANCE**  
Sylvie Bernier, Frédéric Lemay, Yves Pepin et Fortuné Sossa

Québec 

## TABLEAUX DES INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉPARTIS SELON LES PROGRAMMES SERVICES

Ce fichier Excel présente par programme services (tels que définis par l'architecture des services de santé et des services sociaux du MSSS), les indicateurs retenus pour les portraits de santé produits pour le plan annuel du CIUSSS pouvant concerner le programme. Les onglets présentent aussi la disponibilité de l'indicateur au niveau géographique (régional ou locale) et sa fréquence de mise à jour.

### Contenu des portraits

Les indicateurs retenus sont tirés pour l'essentiel du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants et ils se retrouvent pour l'essentiel à l'Infocentre national de santé publique.

Les indicateurs du Plan national de surveillance sont ceux convenus par la table de concertation nationale de surveillance (TCNS) et les autres tables thématiques de Santé publique (TCNMI, TCNSE, TCNST). Il s'agit des indicateurs de l'état de santé et de ses déterminants qui ont été convenus de suivre dans le temps pour répondre à l'obligation légale des directeurs de santé publique d'élaborer des plans de surveillance.

Il s'agit d'indicateurs populationnels davantage en lien avec la prévention/promotion en santé publique. Il ne s'agit pas du portrait des clientèles. Dans ce contexte, certains programmes services auront peu d'indicateurs propres (ex : TDI-TED).

### Les sources

Les sources de données sont multiples, certaines sont annuelles (naissances, mortinaissances, décès, hospitalisations) et produites par le MSSS, mais elles demandent toutes d'être validées et que le fichier soit fermé avant d'être utilisées, ainsi il ne s'agit pas de données en temps réel. Des retards sont fréquents. De plus, le fichier des tumeurs (FiTQ) n'est plus produit et le Registre québécois des cancers ne permet pas encore de produire des indicateurs sur une période d'années suffisante. D'autres sources exigeant un jumelage de fichiers (SISMACQ ou les grossesses) sont aussi produites annuellement, mais peuvent présenter des délais de production.

Les autres sources de données proviennent soit d'autres ministères (SAAQ, MEES, MSP, etc.) à leur fréquence propre, soit du Recensement (aux 5 ans), soit d'enquêtes : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), etc. Ces enquêtes sont à fréquence variable (aux 2 ans en continu pour l'ESCC, aux 5 ou 6 ans pour l'EQSP ou l'EQSJS ou parfois ponctuelles) et portent sur des années différentes. Le contenu de ces enquêtes (ENM, ESCC, EQSP) peut aussi varier même si elles sont répétées et affecter la fréquence de production des indicateurs.

De façon générale, un portrait ne peut donc pas techniquement être produit pour une même unité de temps ou à une fréquence annuelle. Les portraits sont réalisés à une fréquence d'au maximum 5 ans, pour permettre d'interpréter une évolution avec un maximum d'information à jour. De fait, même si certaines sources sont mises à jour annuellement, les mesures les utilisant portent généralement sur 5 ans pour assurer une puissance statistique aux indicateurs produits à l'échelle d'une région ou d'un RLS.

La mise à jour annuelle reste toutefois réalisable pour certains indicateurs sous forme de tableaux de bord, qui pourraient être produits par l'Infocentre du CIUSSS si cette fréquence s'avère incontournable.



## Table des matières

	Pages
Général .....	4 à 10
Santé physique .....	11 à 17
Santé publique .....	18 à 26
Services généraux .....	27 à 31
Perte d'autonomie liée au vieillissement .....	32 à 36
Déficiences physiques .....	37 à 38
DI TED .....	39
Jeunes en difficulté .....	40 à 41
Dépendances .....	42 à 43
Santé mentale .....	44 à 47
Lexique .....	48

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### GÉNÉRAL

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### Conditions démographiques

#### Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS			% RLS sur la population régionale
	Hommes	Femmes	Total	
Population totale	32 127	32 296	64 423	12,4
0-17 ans	5 063	4 698	9 761	
0-5 ans	1 687	1 597	3 284	
6-11 ans	1 785	1 662	3 447	
12-17 ans	1 591	1 439	3 030	
18-64 ans	18 968	18 281	37 249	
18-24 ans	1 958	1 925	3 883	
25-44 ans	7 343	6 846	14 189	
45-64 ans	9 667	9 510	19 177	
65 ans et +	8 096	9 317	17 413	
65-74 ans	4 996	4 881	9 877	
75-84 ans	2 297	2 764	5 061	
85 ans et +	803	1 672	2 475	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

#### Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%		
Hommes	32 127			
0-17 ans	5 063	15,8	17,9	19,3
18-64 ans	18 968	59,0	59,8	62,8
65 ans et +	8 096	25,2	22,4	17,9
65-74 ans	4 996	15,6	13,7	10,8
75 ans et +	3 100	9,6	8,7	7,0
Femmes	32 296			
0-17 ans	4 698	14,5	16,9	18,4
18-64 ans	18 281	56,6	57,3	60,7
65 ans et +	9 317	28,8	25,8	21,0
65-74 ans	4 881	15,1	13,7	11,2
75 ans et +	4 436	13,7	12,1	9,8

**Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019 (suite)**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Total	64 423					
0-17 ans	9 761	15,2	17,4		18,8	
18-64 ans	37 249	57,8	58,6		61,7	
65 ans et +	17 413	27,0	24,1		19,4	
65-74 ans	9 877	15,3	13,7		11,0	
75 ans et +	7 536	11,7	10,4		8,4	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population,

**Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2024**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Total	64 749					
0-17 ans	10 213	15,8	17,8		19,4	
18-64 ans	34 256	52,9	54,5		58,6	
65 ans et +	20 280	31,3	27,8		22,1	
65-74 ans	11 165	17,2	15,1		12,0	
75 ans et +	9 115	14,1	12,7		10,1	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

**Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014 à 2019**

	RLS		Région		Québec	
	%		%		%	
Total	0,2		2,1		4,0	
0-17 ans	2,7		3,0		5,7	
18-64 ans	-6,3		-3,6		-0,3	
65 ans et +	15,5		18,6		18,2	

**Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019 à 2024**

	RLS		Région		Québec	
	Δ	%	%		%	
Total	326	0,5	2,0		3,6	
0-17 ans	452	4,6	4,3		6,3	
18-64 ans	-2 993	-8,0	-5,1		-1,8	
65 ans et +	2 867	16,5	17,6		17,8	

**Taux d'accroissement naturel, 2012-2016**

	Δ	RLS			Région		Québec	
		Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	-819	-2,5	(-2,4 - -2,7)	(-)	0,3	(0,3 - 0,3)	2,9	(2,9 - 2,9)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017;

### Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	%		
Population ayant une identité autochtone	980	1,6		2,2		2,3	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

### Fécondité, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		IC			IC	IC		
Nombre moyen de naissances	550							
Indice synthétique de fécondité		1,66		(+)	1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,4	(28,2 - 28,6)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		47,7	(46,0 - 49,5)	ns	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	19	13,6	(11,1 - 16,6)	(+)	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	99	60,2	(55,1 - 65,7)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	204	127,7	(120,1 - 135,8)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	165	94,3	(88,1 - 101,0)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	51	29,5	(26,1 - 33,3)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	11	6,8	(5,2 - 8,9)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

## Conditions socioculturelles

### Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	%		
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	5 645						
% familles biparentales	3 855	68,3	(-)	72,5		75,4	
% familles monoparentales	1 790	31,7	(+)	27,5		24,6	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

### Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	%		
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	2 780	28,1	(+)	24,0		21,4	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Proportion de la population en ménage privé de 15 ans et plus vivant seule, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Population vivant seule	11 760	22,0	(+)	19,8	17,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Conditions socioéconomiques****Scolarité des 25-64 ans, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
<b>Plus haut diplôme atteint</b>					
Population de 25 à 64 ans	33 270				
Inférieur au certificat d'études secondaires	5 230	15,7	(+)	16,6	13,3
Certificat d'études secondaires seulement	6 750	20,3	(+)	19,0	18,5
Études postsecondaires inférieures au bacc.	16 820	50,6	(+)	49,1	42,7
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	4 465	13,4	(-)	15,3	25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Taux d'emploi, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(-)	%	%
Taux d'emploi	26 310	49,2	(-)	55,6	59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Taux de chômage, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Taux de chômage	2 465	8,6	(+)	7,1	7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	8 940	14,5	(+)	11,5	13,0
Hommes	4 265	13,9	(+)	10,8	12,4
Femmes	4 675	15,0	(+)	12,2	13,7
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	5 395	8,7	(-)	7,1	9,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil



### Taux de prestataires d'assistance sociale, 2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)	5 210	11,0	(10,7 - 11,3)	(+)	8,4	(8,3 - 8,5)	6,1	(6,1 - 6,1)

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire

### Proportion de la population de 65 ans et plus en ménage privé bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Taux de bénéficiaires	6 670	46,4	(+)	47,1		39,0	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

### Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Sécurité alimentaire	N/D	93,6		93,6	(92,0 - 94,9)	92,6	(92,1 - 93,2)
Insécurité alimentaire modérée	N/D	4,0		4,0	(3,0 - 5,4)	4,9	(4,5 - 5,4)
Insécurité alimentaire grave	N/D	* 2,4		* 2,4	(1,6 - 3,5)	2,4	(2,1 - 2,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## Environnement social

### Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS					Région		Québec			
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Très satisfaits de sa vie sociale	28 500	51,1	(45,9 - 56,3)	ns	49,9	(44,4 - 55,4)	ns	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Très faible sentiment d'appartenance	N/D	6,6		6,6	(5,3 - 8,2)	8,8	(8,2 - 9,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2017**

	RLS				Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC		%	IC	
Vulnérables dans au moins un domaine	160	29,2	(25,4 - 33,2)	ns	26,0	(24,8 - 27,3)		27,7	(27,3 - 28,1)	

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

**État de santé globale**
**Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015**

	RLS					Région				Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
Excellente ou très bonne santé	33 600	60,1	(54,6 - 65,4)	ns	59,8	(54,0 - 65,4)	ns	56,6	(54,4 - 58,7)	56,4	(55,8 - 57,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015**

	RLS					Région				Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
15 ans et plus	5 900	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 9,9	(7,1 - 13,7)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	3 000	* 20,0	(13,3 - 29,1)	ns				18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Espérance de vie à la naissance, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC		Esp. de vie	IC	
Masculin	79,6	(78,9 - 80,2)	(-)		79,6	(79,4 - 79,9)		80,3	(80,3 - 80,4)	
Féminin	83,1	(82,4 - 83,7)	(-)		83,9	(83,6 - 84,1)		84,3	(84,2 - 84,3)	
Total	81,4	(80,9 - 81,9)	(-)		81,8	(81,6 - 82,0)		82,4	(82,3 - 82,4)	

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006**

	RLS				Région				Québec	
	Esp. de vie s	IC			Esp. de vie s	IC		Esp. de vie s	IC	
Masculin	65,7	(65,0 - 66,4)	ns		66,3	(66,0 - 66,5)		66,4	(66,3 - 66,5)	
Féminin	67,8	(67,2 - 68,4)	ns		68,4	(68,2 - 68,6)		68,2	(68,2 - 68,3)	
Total	66,7	(66,2 - 67,2)	(-)		67,3	(67,1 - 67,5)		67,3	(67,3 - 67,4)	

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

## État de santé physique - santé des nouveau-nés

### Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	3	* 4,9	(2,9 - 8,4)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	4	* 6,7	(4,3 - 10,5)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Expérience de soins

### Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant un médecin de famille	N/D	86,3	(82,4 - 89,8)	(+)	84,7	(83,0 - 86,3)	78,7	(78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### SANTÉ PHYSIQUE

#### Conditions démographiques

##### Fécondité, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	IC			IC		IC	
Nombre moyen de naissances	550							
Indice synthétique de fécondité		1,66	(+)		1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,4	(28,2 - 28,6)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		47,7	(46,0 - 49,5)	ns	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	19	13,6	(11,1 - 16,6)	(+)	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	99	60,2	(55,1 - 65,7)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	204	127,7	(120,1 - 135,8)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	165	94,3	(88,1 - 101,0)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	51	29,5	(26,1 - 33,3)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	11	6,8	(5,2 - 8,9)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

##### Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux d'IVG	N/D	8,6	8,6	(8,3 - 8,9)	12,6	(12,5 - 12,7)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

#### Ressources et services de santé et services sociaux

##### Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

Taux pour 10 000 personnes	RLS				Région			Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%	
Total des hospitalisations	6 822	893,3	(876,4 - 910,6)	(+)	100,0	854,3	(848,4 - 860,2)	100,0	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0
Tumeurs	539	63,1	(59,0 - 67,5)	ns	7,9	57,6	(56,2 - 59,1)	7,3	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5
Maladies de l'appareil circulatoire	1 201	129,1	(123,5 - 135,0)	(+)	17,6	117,7	(115,7 - 119,8)	15,9	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	928	111,4	(105,8 - 117,3)	(+)	13,6	101,8	(99,8 - 103,8)	12,7	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1
Maladies de l'appareil digestif	666	86,2	(81,1 - 91,6)	(+)	9,8	78,0	(76,2 - 79,8)	9,2	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	640	80,9	(76,0 - 86,1)	(+)	9,4	76,8	(75,1 - 78,6)	9,2	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1
Grossesse, accouchements et puerpéralité	585	115,1	(108,3 - 122,4)	ns	8,6	113,2	(110,8 - 115,6)	10,3	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé globale

### Population en ménage privé ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Population ayant une incapacité	9 825	16,1	(+)	14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

### Taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	3	* 115,2	(70,6 - 188,1)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	np	-----	-----	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	2	* 27,7	(14,4 - 53,2)	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	13	93,9	(73,5 - 119,9)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	96	452,6	(413,9 - 494,9)	(+)	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	135	1 632,4	(1 513,8 - 1 760,3)	(+)	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	480	7 031,0	(6 755,3 - 7 317,9)	(+)	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	730	1 134,9	(1 098,7 - 1 172,4)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	730	803,2	(777,2 - 830,1)	(+)	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Région		Québec				
					Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC	
Tumeurs malignes	227	253,9	(239,4 - 269,3)	ns	353,0	(333,1 - 374,2)	(+)	244,4	(238,9 - 249,9)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	174	187,3	(175,2 - 200,3)	(+)	270,9	(253,5 - 289,5)	(+)	177,1	(172,5 - 181,8)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	85	89,9	(81,7 - 98,9)	(+)	132,5	(120,5 - 145,7)	(+)	85,0	(81,8 - 88,2)	73,1	(72,3 - 73,9)
Traumatismes non intentionnels	21	24,0	(19,7 - 29,2)	ns	32,3	(26,7 - 39,2)	ns	31,3	(29,3 - 33,4)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	33	36,1	(30,9 - 42,2)	(+)	51,0	(43,8 - 59,4)	(+)	29,9	(28,0 - 31,9)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	26	28,3	(23,8 - 33,7)	ns	40,1	(33,8 - 47,7)	(+)	19,4	(17,9 - 21,0)	23,8	(23,3 - 24,3)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	16	17,1	(13,7 - 21,3)	ns	24,6	(19,7 - 30,6)	(+)	14,9	(13,6 - 16,2)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Surpoids	30 800	58,0	(52,5 - 63,2)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	9 000	17,0	(13,2 - 21,7)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Migraines (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,3 - 8,4)	9,0	(8,4 - 9,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Hommes	N/D	** 1,1	** 1,1	(0,5 - 2,5)	2,9	(2,3 - 3,7)
Femmes	N/D	* 14,0	* 14,0	(10,3 - 18,7)	12,1	(11,2 - 13,1)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	ns	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence des cardiopathies ischémiques	6 375	7,6	(7,4 - 7,9)	ns	12,0	(11,6 - 12,4)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	(+)	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 085	2,9	(2,7 - 3,0)	(+)	3,9	(3,7 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	(-)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'asthme	5 880	10,4	(10,1 - 10,8)	(-)	9,3	(9,0 - 9,6)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(+)	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	5 530	10,0	(9,6 - 10,4)	(+)	12,8	(12,4 - 13,2)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	16 510	21,1	(20,6 - 21,5)	(+)	31,1	(30,5 - 31,7)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète	6 645	8,5	(8,2 - 8,8)	(+)	12,5	(12,1 - 12,9)	(+)	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	481	601,7	(577,9 - 626,5)	(+)	739,2	(710,3 - 769,4)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	68	82,1	(73,8 - 91,4)	ns	104,6	(94,0 - 116,3)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	12	15,3	(11,9 - 19,7)	ns	19,1	(14,9 - 24,5)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	6	* 7,6	(5,4 - 10,8)	ns	* 9,8	(7,0 - 13,9)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	89	110,0	(100,2 - 120,8)	(+)	136,3	(124,2 - 149,6)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	47	111,5	(97,8 - 127,2)	(-)	140,9	(123,9 - 160,2)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	48	133,3	(117,4 - 151,4)	ns	149,1	(131,3 - 169,3)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	20,0	(16,1 - 25,0)	ns	24,6	(19,8 - 30,6)	(+)	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	31	37,4	(31,9 - 43,9)	ns	47,1	(40,2 - 55,1)	(+)	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	14	17,1	(13,5 - 21,6)	ns	21,5	(17,0 - 27,2)	(+)	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	17	21,7	(17,5 - 26,9)	ns	26,1	(21,1 - 32,3)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	29	31,4	(26,6 - 37,0)	ns	44,5	(37,8 - 52,4)	(+)	28,5	(26,7 - 30,5)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	5	* 5,0	(3,3 - 7,5)	ns	* 7,2	(4,8 - 10,8)	ns	5,9	(5,1 - 6,9)	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	14	15,7	(12,3 - 19,9)	ns	21,1	(16,7 - 26,8)	(+)	14,0	(12,8 - 15,4)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	9	23,1	(17,2 - 31,0)	ns	28,2	(21,1 - 37,8)	ns	22,4	(20,0 - 25,1)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	10	22,5	(17,0 - 29,9)	ns	32,1	(24,4 - 42,1)	ns	23,4	(21,1 - 25,9)	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	77	87,4	(79,0 - 96,7)	(+)	120,1	(108,7 - 132,6)	(+)	78,4	(75,3 - 81,5)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	4	* 4,5	(2,9 - 7,1)	(-)	* 6,2	(4,0 - 9,6)	ns	8,1	(7,2 - 9,2)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	10	11,0	(8,3 - 14,6)	ns	15,2	(11,5 - 20,2)	(+)	9,6	(8,6 - 10,8)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Cardiopathies ischémiques	91	98,6	(89,9 - 108,2)	(+)	141,2	(128,8 - 154,8)	(+)	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	32	33,9	(29,0 - 39,6)	ns	50,1	(42,9 - 58,4)	(+)	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	37	39,7	(34,3 - 45,8)	(+)	58,2	(50,4 - 67,1)	(+)	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	6	* 6,9	(4,8 - 9,7)	ns	* 10,0	(7,0 - 14,1)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Grippe et pneumopathie	26	27,5	(23,2 - 32,7)	(+)	40,7	(34,3 - 48,4)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	42	44,2	(38,5 - 50,6)	(+)	64,7	(56,5 - 74,1)	(+)	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Maladies du foie	10	10,9	(8,2 - 14,5)	ns	14,9	(11,3 - 19,8)	(+)	9,9	(8,8 - 11,0)	9,2	(8,9 - 9,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté		
Insuffisance rénale	10	10,6	(8,1 - 14,1)	ns	15,6	(11,8 - 20,5)	ns	9,5	(8,5 - 10,6)	10,1	(9,8 - 10,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - santé des nouveau-nés**
**Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017**

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	41	7,5	(6,5 - 8,5)	(+)	6,2	(5,9 - 6,5)		5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017**

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances prématurées	46	8,4	(7,4 - 9,5)	(+)	7,2	(6,9 - 7,5)		7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013 à 2017**

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	54	10,0	(8,9 - 11,2)	(+)	8,7	(8,3 - 9,1)		8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	3	* 4,9	(2,9 - 8,4)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)		4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2010 à 2014**

	RLS			Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	4	* 6,7	(4,3 - 10,5)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)		7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017



## État de santé physique - traumatismes non intentionnels

### Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	6 000	* 10,7	(7,8 - 14,5)		* 11,3	(8,1 - 15,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	16 300	29,7	(25,0 - 34,3)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)		30,3	(29,6 - 31,1)		

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

### Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	440	113,5	(99,5 - 128,8)	(+)	120,1	(105,8 - 135,6)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	3	* 4,4	(2,6 - 7,3)	ns	* 5,0	(3,0 - 8,1)	ns	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	3	* 3,6	(2,0 - 6,3)	ns	* 4,0	(2,3 - 7,0)	ns	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	13,3	(10,3 - 17,0)	ns	19,6	(15,3 - 25,1)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	4	* 4,8	(3,2 - 7,4)	(-)	* 6,8	(4,5 - 10,4)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	8	8,4	(6,2 - 11,4)	(+)	12,8	(9,4 - 17,3)	(+)	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				79,5	(61,7 - 102,4)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
<b>Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles</b>	492	62,2	(58,9 - 65,7)	(+)	76,5	(72,6 - 80,6)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	27	4,1	(3,2 - 5,1)	(+)	4,2	(3,3 - 5,2)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	341	38,7	(36,2 - 41,3)	(+)	53,1	(49,9 - 56,5)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	60	10,5	(9,0 - 12,2)	(+)	9,4	(8,1 - 10,9)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

## État de santé physique - maladies infectieuses

### Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	198	307,7	(267,7 - 353,7)	ns	368,2	(352,0 - 385,1)		316,5	(312,8 - 320,3)		

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

## Expérience de soins

### Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin	N/D	79,2	(74,6 - 83,5)	ns	75,7	(73,9 - 77,5)	75,0	(74,5 - 75,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

### Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit	N/D	12,5	(8,2 - 16,8)	ns	9,5	(7,9 - 11,1)	11,0	(10,6 - 11,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

### Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un spécialiste à la suite d'une référence	N/D	32,9	(27,9 - 37,9)	ns	27,6	(25,7 - 29,5)	30,5	(30,0 - 31,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

### Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	13,9	(10,3 - 17,6)	(+)	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

### Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	39,9	(34,6 - 45,1)	(+)	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### SANTÉ PUBLIQUE

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### Conditions démographiques

##### Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

#### Conditions socioéconomiques

##### Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	600	* 24,5	(15,7 - 36,0)	ns	20,3	(17,7 - 23,2)	17,5	(16,8 - 18,3)
Garçons	300	** 26,8	(15,7 - 41,9)	ns	25,0	(21,6 - 28,7)	21,3	(20,3 - 22,3)
Filles	200	* 21,8	(13,7 - 32,9)	ns	15,4	(12,9 - 18,2)	13,6	(12,8 - 14,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Taux d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (RLS de résidence), 2011-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	83	16,3	(14,4 - 18,1)	ns	15,4	(14,8 - 16,0)	15,2	(15,1 - 15,4)
Garçons	50	20,2	(17,3 - 23,1)	ns	19,2	(18,2 - 20,1)	18,7	(18,4 - 18,9)
Filles	33	12,5	(10,2 - 14,8)	ns	11,8	(11,1 - 12,6)	12,0	(11,8 - 12,2)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MEES)

#### Environnement physique

##### Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Exposition fumée secondaire	N/D	* 6,2	* 6,2	(4,5 - 8,3)	4,8	(4,3 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	ns	%	IC	%	IC
Logements avec réparations majeures	1 945	6,3	ns	6,0		6,4	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

**Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Fortement dérangé par le bruit à domicile	8 100	14,5	(11,2 - 18,7)	ns	12,6	(11,2 - 14,2)	16,4	(15,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Environnement social**

**Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Élèves victimisés	700	30,5	(27,3 - 33,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Habitudes de vie et comportements**

**Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes	N/D	60,6	60,6	(57,5 - 63,6)	61,4	(60,5 - 62,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	(-)	%	IC	%	IC
Nombre de portions minimales de fruits et légumes	400	* 17,3	(11,9 - 24,5)	(-)	22,6	(20,8 - 24,5)	25,6	(24,9 - 26,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou p	12 100	21,7	(17,7 - 26,3)	21,0	22,7	(20,9 - 24,6)	19,0	(18,6 - 19,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif	N/D	37,2	37,2	(33,2 - 41,1)	40,1	(39,0 - 41,3)
12-17 ans, très actifs	N/D	np	np	-----	43,5	(39,4 - 47,5)
Garçons	N/D	np	np	-----	51,0	(45,4 - 56,6)
Filles	N/D	np	np	-----	35,4	(29,7 - 41,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

np : du fait d'un fort coefficient de variation, la donnée régionale n'est pas présentée

**Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	600	24,5	(19,8 - 30,0)	(-)	32,4	(29,8 - 35,1)	31,8	(31,0 - 32,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Fumeurs actuels	12 400	22,1	(18,1 - 26,9)	ns	22,2	(17,8 - 27,3)	19,6	(17,8 - 21,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Entre 5 et 11 ans	N/D	** 3,0	** 3,0	(1,3 - 6,8)	1,7	(1,3 - 2,2)
Entre 12 et 14 ans	N/D	* 14,4	* 14,4	(10,2 - 20,1)	15,9	(14,2 - 17,8)
Entre 15 et 19 ans	N/D	61,1	61,1	(52,6 - 69,0)	53,7	(51,1 - 56,3)
20 ans et plus	N/D	* 21,5	* 21,5	(15,7 - 28,7)	28,7	(26,3 - 31,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fumeurs actuels	100	* 5,0	(3,5 - 7,2)	(+)	4,7	(3,7 - 5,9)	3,1	(2,8 - 3,3)
Fumeurs débutants	100	** 2,9	(1,5 - 5,7)	ns	2,7	(2,1 - 3,3)	2,4	(2,2 - 2,6)
Non-Fumeurs	2 500	92,0	(88,3 - 94,6)	ns	92,7	(91,2 - 93,9)	94,6	(94,2 - 94,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	1 100	44,5	(39,8 - 49,4)	(+)	45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation actuel de cannabis	700	27,3	(22,7 - 32,4)	(+)	22,5	(20,7 - 24,4)	18,2	(17,6 - 18,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	32 100	82,3	(76,8 - 86,7)	(+)	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2013-2014**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	12 700	57,9	(50,0 - 65,4)	(-)	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	7 084	65,5	(64,4 - 66,7)	ns	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

**Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	48 400	91,1	(87,0 - 94,0)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de cyclistes portant un casque à bicyclette, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Port du casque	N/D	29,3	29,3	(23,9 - 34,7)	42,4	(40,7 - 44,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Non-utilisation de la ceinture	N/D	10,8	10,8		9,9	

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

**Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329	329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

## État de santé globale

### Taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	3	* 115,2	(70,6 - 188,1)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	np	-----	-----	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	2	* 27,7	(14,4 - 53,2)	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	13	93,9	(73,5 - 119,9)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	96	452,6	(413,9 - 494,9)	(+)	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	135	1 632,4	(1 513,8 - 1 760,3)	(+)	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	480	7 031,0	(6 755,3 - 7 317,9)	(+)	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	730	1 134,9	(1 098,7 - 1 172,4)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	730	803,2	(777,2 - 830,1)	(+)	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	227	253,9	(239,4 - 269,3)	ns	353,0	(333,1 - 374,2)	244,4	(238,9 - 249,9)
Maladies de l'appareil circulatoire	174	187,3	(175,2 - 200,3)	(+)	270,9	(253,5 - 289,5)	177,1	(172,5 - 181,8)
Maladies de l'appareil respiratoire	85	89,9	(81,7 - 98,9)	(+)	132,5	(120,5 - 145,7)	85,0	(81,8 - 88,2)
Maladies du système nerveux	61	64,6	(57,8 - 72,3)	(+)	95,5	(85,4 - 106,8)	59,9	(57,2 - 62,6)
Troubles mentaux et du comportement	37	38,8	(33,6 - 44,9)	ns	57,9	(50,1 - 66,8)	37,1	(35,1 - 39,3)
Traumatismes non intentionnels	21	24,0	(19,7 - 29,2)	ns	32,3	(26,7 - 39,2)	31,3	(29,3 - 33,4)
Maladies de l'appareil digestif	33	36,1	(30,9 - 42,2)	(+)	51,0	(43,8 - 59,4)	29,9	(28,0 - 31,9)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	26	28,3	(23,8 - 33,7)	ns	40,1	(33,8 - 47,7)	19,4	(17,9 - 21,0)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	14	15,5	(12,3 - 19,5)	ns	22,4	(17,8 - 28,2)	15,4	(14,1 - 16,8)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	16	17,1	(13,7 - 21,3)	ns	24,6	(19,7 - 30,6)	14,9	(13,6 - 16,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Populaton édentée	9 300	13,9	(11,2 - 17,2)	(+)	16,6	(13,2 - 20,6)	13,8	(12,6 - 15,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	30 800	58,0	(52,5 - 63,2)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	9 000	17,0	(13,2 - 21,7)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 300	** 2,5	(1,2 - 5,1)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	16 510	21,1	(20,6 - 21,5)	(+)	31,1	(30,5 - 31,7)	(+)	19,1 (19,0 - 19,3)	19,8 (19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence du diabète des 1 an et plus, 2015-2016**

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	30				* 0,3	(0,2 - 0,5)	ns	0,3 (0,2 - 0,3)	0,3 (0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	6 645	8,5	(8,2 - 8,8)	(+)	12,5	(12,1 - 12,9)	(+)	7,6 (7,5 - 7,7)	8,0 (7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	481	601,7	(577,9 - 626,5)	(+)	739,2	(710,3 - 769,4)	(+)	563,8 (554,8 - 572,9)	572,6 (570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	68	82,1	(73,8 - 91,4)	ns	104,6	(94,0 - 116,3)	(+)	75,1 (71,9 - 78,5)	74,8 (73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	12	15,3	(11,9 - 19,7)	ns	19,1	(14,9 - 24,5)	ns	13,9 (12,5 - 15,4)	14,9 (14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	6	* 7,6	(5,4 - 10,8)	ns	* 9,8	(7,0 - 13,9)	ns	9,4 (8,3 - 10,6)	11,0 (10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	89	110,0	(100,2 - 120,8)	(+)	136,3	(124,2 - 149,6)	(+)	102,2 (98,5 - 106,1)	98,6 (97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	47	111,5	(97,8 - 127,2)	(-)	140,9	(123,9 - 160,2)	ns	126,8 (120,9 - 132,9)	137,4 (135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	48	133,3	(117,4 - 151,4)	ns	149,1	(131,3 - 169,3)	(+)	136,7 (130,2 - 143,5)	131,0 (129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	20,0	(16,1 - 25,0)	ns	24,6	(19,8 - 30,6)	(+)	16,9 (15,4 - 18,5)	17,2 (16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	31	37,4	(31,9 - 43,9)	ns	47,1	(40,2 - 55,1)	(+)	31,1 (29,0 - 33,2)	30,7 (30,2 - 31,3)
Leucémies	14	17,1	(13,5 - 21,6)	ns	21,5	(17,0 - 27,2)	(+)	13,3 (12,0 - 14,7)	14,6 (14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	17	21,7	(17,5 - 26,9)	ns	26,1	(21,1 - 32,3)	ns	20,3 (18,7 - 22,1)	21,2 (20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	29	31,4	(26,6 - 37,0)	ns	44,5	(37,8 - 52,4)	(+)	28,5 (26,7 - 30,5)	28,7 (28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	5	* 5,0	(3,3 - 7,5)	ns	* 7,2	(4,8 - 10,8)	ns	5,9 (5,1 - 6,9)	6,4 (6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	14	15,7	(12,3 - 19,9)	ns	21,1	(16,7 - 26,8)	(+)	14,0 (12,8 - 15,4)	13,7 (13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	9	23,1	(17,2 - 31,0)	ns	28,2	(21,1 - 37,8)	ns	22,4 (20,0 - 25,1)	23,8 (23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	10	22,5	(17,0 - 29,9)	ns	32,1	(24,4 - 42,1)	ns	23,4 (21,1 - 25,9)	28,7 (28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	77	87,4	(79,0 - 96,7)	(+)	120,1	(108,7 - 132,6)	(+)	78,4 (75,3 - 81,5)	72,6 (71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	4	* 4,5	(2,9 - 7,1)	(-)	* 6,2	(4,0 - 9,6)	ns	8,1 (7,2 - 9,2)	7,9 (7,6 - 8,1)
Leucémie	10	11,0	(8,3 - 14,6)	ns	15,2	(11,5 - 20,2)	(+)	9,6 (8,6 - 10,8)	8,7 (8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017



**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	91	98,6	(89,9 - 108,2)	(+)	141,2	(128,8 - 154,8)	(+)	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	32	33,9	(29,0 - 39,6)	ns	50,1	(42,9 - 58,4)	(+)	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	37	39,7	(34,3 - 45,8)	(+)	58,2	(50,4 - 67,1)	(+)	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	6	* 6,9	(4,8 - 9,7)	ns	* 10,0	(7,0 - 14,1)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	26	27,5	(23,2 - 32,7)	(+)	40,7	(34,3 - 48,4)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	42	44,2	(38,5 - 50,6)	(+)	64,7	(56,5 - 74,1)	(+)	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - santé des nouveau-nés**
**Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017**

	Nbre	%	IC	RLS		%	IC	Région		Québec	
								%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	41	7,5	(6,5 - 8,5)	(+)		6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)		

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017**

	Nbre	%	IC	RLS		%	IC	Région		Québec	
								%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	54	10,0	(8,9 - 11,2)	(+)		8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)		

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**
**Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC		Région		Québec	
								% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	6 000	* 10,7	(7,8 - 14,5)		* 11,3	(8,1 - 15,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Accident de transport	3	* 4,4	(2,6 - 7,3)	ns	* 5,0	(3,0 - 8,1)	ns	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	3	* 3,6	(2,0 - 6,3)	ns	* 4,0	(2,3 - 7,0)	ns	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	13,3	(10,3 - 17,0)	ns	19,6	(15,3 - 25,1)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	4	* 4,8	(3,2 - 7,4)	(-)	* 6,8	(4,5 - 10,4)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	8	8,4	(6,2 - 11,4)	(+)	12,8	(9,4 - 17,3)	(+)	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				79,5	(61,7 - 102,4)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
<b>Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles</b>	492	62,2	(58,9 - 65,7)	(+)	76,5	(72,6 - 80,6)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	27	4,1	(3,2 - 5,1)	(+)	4,2	(3,3 - 5,2)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	341	38,7	(36,2 - 41,3)	(+)	53,1	(49,9 - 56,5)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	242				156,2	(145,0 - 168,2)	(+)	153,3	(150,0 - 156,6)	134,3	(133,5 - 135,2)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	60	10,5	(9,0 - 12,2)	(+)	9,4	(8,1 - 10,9)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

**État de santé physique - maladies infectieuses**
**Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
<b>Taux d'incidence pour 100 000</b>	198	307,7	(267,7 - 353,7)	ns	368,2	(352,0 - 385,1)	316,5	(312,8 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

**État de santé psychosociale ou mentale**
**Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0		30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	2 700	* 9,0	(5,6 - 14,2)	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	15 500	27,7	(23,0 - 33,0)	28,9	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	6 000	* 22,6	(16,5 - 30,1)	* 24,8	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	9 500	32,4	(25,5 - 40,1)	32,8	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	800	33,7	(28,1 - 39,7)	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 600	** 3,0	(1,6 - 5,6)	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	13	20,7	(16,1 - 26,6)	(+)	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7583,5		7583,5	(7304,8 - 7872,9)	6090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### SERVICES GÉNÉRAUX

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### Conditions démographiques

##### Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017;  
RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

#### Habitudes de vie et comportements

##### Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	32 100	82,3	(76,8 - 86,7)	(+)	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	12 700	57,9	(50,0 - 65,4)	(-)	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique	7 084	65,5	(64,4 - 66,7)	ns	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

##### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	48 400	91,1	(87,0 - 94,0)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	30 800	58,0	(52,5 - 63,2)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	9 000	17,0	(13,2 - 21,7)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +)	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence des cardiopathies ischémiques	6 375	7,6	(7,4 - 7,9)	ns	12,0	(11,6 - 12,4)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'asthme	5 880	10,4	(10,1 - 10,8)	(-)	9,3	(9,0 - 9,6)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Prévalence de la MPOC	5 530	10,0	(9,6 - 10,4)	(+)	12,8	(12,4 - 13,2)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'hypertension	16 510	21,1	(20,6 - 21,5)	(+)	31,1	(30,5 - 31,7)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence du diabète des 1 an et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	30				* 0,3	(0,2 - 0,5)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	6 645	8,5	(8,2 - 8,8)	(+)	12,5	(12,1 - 12,9)	(+)	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	481	601,7	(577,9 - 626,5)	(+)	739,2	(710,3 - 769,4)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	68	82,1	(73,8 - 91,4)	ns	104,6	(94,0 - 116,3)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	12	15,3	(11,9 - 19,7)	ns	19,1	(14,9 - 24,5)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	6	* 7,6	(5,4 - 10,8)	ns	* 9,8	(7,0 - 13,9)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	89	110,0	(100,2 - 120,8)	(+)	136,3	(124,2 - 149,6)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	47	111,5	(97,8 - 127,2)	(-)	140,9	(123,9 - 160,2)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	48	133,3	(117,4 - 151,4)	ns	149,1	(131,3 - 169,3)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	20,0	(16,1 - 25,0)	ns	24,6	(19,8 - 30,6)	(+)	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	31	37,4	(31,9 - 43,9)	ns	47,1	(40,2 - 55,1)	(+)	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	14	17,1	(13,5 - 21,6)	ns	21,5	(17,0 - 27,2)	(+)	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	17	21,7	(17,5 - 26,9)	ns	26,1	(21,1 - 32,3)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

### État de santé physique - santé des nouveau-nés

#### Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	41	7,5	(6,5 - 8,5)	(+)	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

#### Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances prématurées	46	8,4	(7,4 - 9,5)	(+)	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

#### Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	54	10,0	(8,9 - 11,2)	(+)	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé physique - traumatismes non intentionnels

### Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Victime de blessure non intentionnelle	6 000	* 10,7	(7,8 - 14,5)	* 11,3	(8,1 - 15,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs	4 900	* 9,0	(6,3 - 12,7)	ns	* 8,8	(6,3 - 12,1)	ns	10,4	(9,0 - 11,9)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC	% brut	IC	% brut	IC	% brut	IC	
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	16 300	29,7	(25,0 - 34,3)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)	ns	30,3	(29,6 - 31,1)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

## État de santé psychosociale ou mentale

### Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Ensemble des troubles mentaux	8 510	13,6	(13,2 - 14,0)	(+)	13,4	(13,0 - 13,8)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	4 715	7,3	(7,0 - 7,6)	(+)	7,4	(7,2 - 7,7)	(+)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	350	0,5	(0,5 - 0,6)	(+)	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région				Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région				Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	%	IC	
Travailleurs vivant de la tension au travail	2 700	* 9,0	(5,6 - 14,2)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	ns	11,7	(11,2 - 12,3)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	15 500	27,7	(23,0 - 33,0)	ns	28,9	(23,9 - 34,6)	26,0	(24,1 - 28,1)
Hommes	6 000	* 22,6	(16,5 - 30,1)	ns	* 24,8	(18,0 - 33,1)	21,1	(18,6 - 23,8)
Femmes	9 500	32,4	(25,5 - 40,1)	ns	32,8	(25,4 - 41,1)	30,7	(27,8 - 33,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	800	33,7	(28,1 - 39,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 600	** 3,0	(1,6 - 5,6)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012 à 2016**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	13	20,7	(16,1 - 26,6)	(+)	19,9	(15,6 - 25,4)	16,9	(15,3 - 18,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 100 000 femmes	N/D	386,0	386,0	(374,3 - 398,0)	417,2	(414,1 - 420,3)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

**Expérience de soins**
**Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	13,9	(10,3 - 17,6)	(+)	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	8,4	(5,5 - 11,3)	(-)	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### Conditions démographiques

##### Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		0,2	2,1	4,0
65 ans et +		15,5	18,6	18,2
65-74 ans		19,5	19,0	17,7
75-84 ans		9,4	17,9	18,0
85 ans et plus		13,2	19,1	21,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

##### Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	326	0,5	2,0	3,6
65 ans et +	2 867	16,5	17,6	17,8
75 ans et plus	1 579	21,0	24,5	24,3

#### Conditions socioculturelles

##### Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	14 360	89,0	ns	87,3	89,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

##### Proportion de personnes de 65 ans et plus en ménage privé vivant seules, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Personnes de 65 ans et plus vivant seules	4 860	33,8	(+)	31,1	30,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

## Environnement social

### Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population prodiguant soins aux âgés	12 545	22,9	(+)	20,7		18,6	

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

### Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	N/D	* 15,6		* 15,6	(11,7 - 20,2)	12,2	(11,4 - 13,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## État de santé globale

### Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brute	IC	ns	% ajustée	IC	ns	% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	5 900	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 9,9	(7,1 - 13,7)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	3 000	* 20,0	(13,3 - 29,1)	ns				18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Population en ménage privé ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population ayant une incapacité	9 825	16,1	(+)	14,2		13,9	
65 ans et plus	4 365	35,3	(-)	33,3		36,8	
65-74 ans	1 875	26,2	(-)	24,5		27,2	
75 ans et +	2 490	48,0	(-)	47,3		51,4	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

### Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut		% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9		8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)
65 ans et +	N/D	24,0		24,0	(18,3 - 29,8)	19,6	(17,9 - 21,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Maladies du système nerveux	61	64,6	(57,8 - 72,3)	(+)	95,5	(85,4 - 106,8)	(+)	59,9	(57,2 - 62,6)	48,5	(47,9 - 49,2)
Maladies d'Alzheimer	41	41,8	(36,5 - 48,0)	(+)	63,1	(55,0 - 72,4)	(+)	39,1	(37,0 - 41,3)	27,3	(26,8 - 27,8)
Troubles mentaux et du comportement	37	38,8	(33,6 - 44,9)	ns	57,9	(50,1 - 66,8)	(+)	37,1	(35,1 - 39,3)	41,7	(41,1 - 42,3)
Troubles mentaux organiques, incluent les troubles symptomatiques	35	35,5	(30,6 - 41,2)	ns	53,8	(46,4 - 62,5)	(+)	34,3	(32,3 - 36,3)	38,9	(38,4 - 39,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015**

	Nbre	Région		RLS	Région		Québec	
		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
45-64 ans	3 100	* 14,0	(9,1 - 21,0)	ns	13,9	(11,7 - 16,3)	9,0	(8,6 - 9,6)
65 ans et plus	6 400	43,1	(33,8 - 52,8)	(+)	41,9	(37,7 - 46,2)	33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**État de santé physique - maladies chroniques**
**Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015**

	Nbre	RLS		RLS	Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 300	** 2,5	(1,2 - 5,1)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	N/D	40,5	40,5	(35,5 - 45,7)	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
65 ans et plus	N/D	13,5	13,5	(10,3 - 17,4)	15,5	(14,2 - 16,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 085	2,9	(2,7 - 3,0)	(+)	3,9	(3,7 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	1 565	9,6	(9,0 - 10,3)	(+)	9,6	(9,0 - 10,2)	(+)	9,2	(9,0 - 9,5)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	5 530	10,0	(9,6 - 10,4)	(+)	12,8	(12,4 - 13,2)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	3 565	22,3	(21,4 - 23,3)	(+)	22,5	(21,6 - 23,5)	(+)	19,5	(19,2 - 19,9)	19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	481	601,7	(577,9 - 626,5)	(+)	739,2	(710,3 - 769,4)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	68	82,1	(73,8 - 91,4)	ns	104,6	(94,0 - 116,3)	(+)	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	12	15,3	(11,9 - 19,7)	ns	19,1	(14,9 - 24,5)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	6	* 7,6	(5,4 - 10,8)	ns	* 9,8	(7,0 - 13,9)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	89	110,0	(100,2 - 120,8)	(+)	136,3	(124,2 - 149,6)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	47	111,5	(97,8 - 127,2)	(-)	140,9	(123,9 - 160,2)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	48	133,3	(117,4 - 151,4)	ns	149,1	(131,3 - 169,3)	(+)	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	20,0	(16,1 - 25,0)	ns	24,6	(19,8 - 30,6)	(+)	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	31	37,4	(31,9 - 43,9)	ns	47,1	(40,2 - 55,1)	(+)	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	14	17,1	(13,5 - 21,6)	ns	21,5	(17,0 - 27,2)	(+)	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	17	21,7	(17,5 - 26,9)	ns	26,1	(21,1 - 32,3)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	8 510	13,6	(13,2 - 14,0)	(+)	13,4	(13,0 - 13,8)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
65 ans et plus	2 185	-----	-----		13,8	(13,1 - 14,6)	n.s.	13,1	(12,9 - 13,4)	13,7	(13,6 - 13,8)
65 ans et + (troubles anxiodépressif)	1 130	-----	-----		7,1	(6,6 - 7,7)	n.s.	6,2	(6,0 - 6,4)	7,3	(7,2 - 7,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**N. B. L'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs**

**Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 65 ans et plus	1 225	6,6	(6,1 - 7,1)	n.s	7,7	(7,2 - 8,3)	n.s	7,2	(7,0 - 7,5)	6,8	(6,7 - 6,9)
65-74 ans	175	-----	-----		2,0	(1,6 - 2,4)	n.s	1,9	(1,7 - 2,0)	1,7	(1,6 - 1,7)
75-84 ans	405	-----	-----		8,7	(7,7 - 9,9)	n.s	10,2	(9,7 - 10,6)	9,5	(9,4 - 9,7)
85 ans et plus	650	-----	-----		27,1	(24,4 - 29,9)	n.s	28,8	(27,7 - 30,0)	27,4	(27,1 - 27,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**

**Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	440	113,5	(99,5 - 128,8)	(+)	120,1	(105,8 - 135,6)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	245	150,2	(126,5 - 177,0)	ns	154,8	(130,5 - 182,2)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Chutes grand total	13	13,3	(10,3 - 17,0)	ns	19,6	(15,3 - 25,1)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	4	* 4,8	(3,2 - 7,4)	(-)	* 6,8	(4,5 - 10,4)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	8	8,4	(6,2 - 11,4)	(+)	12,8	(9,4 - 17,3)	(+)	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				79,5	(61,7 - 102,4)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### DÉFICIENCE PHYSIQUE

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### État de santé globale

##### Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population ayant une incapacité	9 825	16,1	(+)	14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

#### État de santé physique - maladies chroniques

##### Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	% brut	% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9	8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

##### Proportion de la population ayant une surdit , population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population ayant une surdit�	10 300	18,9	(15,3 - 23,2)	16,7	(13,3 - 20,7)	15,7	(14,4 - 17,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier ma tre de l'Enqu te qu bécoise sur la sant  de la population (EQSP) 2014-2015

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région				Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)		
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 085	2,9	(2,7 - 3,0)	(+)	3,9	(3,7 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**
**Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	6 000	* 10,7	(7,8 - 14,5)		* 11,3	(8,1 - 15,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	440	113,5	(99,5 - 128,8)	(+)	120,1	(105,8 - 135,6)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	3	* 4,4	(2,6 - 7,3)	ns	* 5,0	(3,0 - 8,1)	ns	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	3	* 3,6	(2,0 - 6,3)	ns	* 4,0	(2,3 - 7,0)	ns	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	13	13,3	(10,3 - 17,0)	ns	19,6	(15,3 - 25,1)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	4	* 4,8	(3,2 - 7,4)	(-)	* 6,8	(4,5 - 10,4)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	8	8,4	(6,2 - 11,4)	(+)	12,8	(9,4 - 17,3)	(+)	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	12				79,5	(61,7 - 102,4)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

DI-TED

**NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### État de santé mentale

#### Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région			Québec			
	Nbre	% brut	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
Prévalence du trouble du spectre de l'autisme	120	0,9	(0,7 - 1,1)	ns	0,9	(0,7 - 1,2)	(-)	0,9	(0,8 - 0,9)	1,2	(1,2 - 1,2)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### JEUNES EN DIFFICULTÉ

#### Environnement social

##### Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	700	30,5	(27,3 - 33,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

#### État de santé psychosociale ou mentale

##### Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Violence infligée	300	25,8	(21,1 - 31,2)	ns	24,7	(22,6 - 27,0)	24,1	(23,3 - 25,0)
Violence subie	400	37,7	(33,1 - 42,5)	ns	36,6	(34,4 - 38,8)	36,2	(35,3 - 37,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un comportement d'agressivité directe	800	34,1	(29,9 - 38,6)	ns	30,7	(28,7 - 32,7)	33,1	(32,4 - 33,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un des trois problèmes	500	21,2	(16,0 - 27,6)	ns	19,9	(18,6 - 21,3)	19,5	(19,0 - 20,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	800	33,7	(28,1 - 39,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016**

	Région				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Prévalence du TDA/H	790	5,8	(5,2 - 6,3)	(+)	6,2	(5,7 - 6,8)	(+)	4,8	(4,6 - 4,9)	4,2	(4,2 - 4,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	30,8	30,8	(30,3 - 31,3)	20,3	(20,2 - 20,4)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

**Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	9,2	9,2	(8,9 - 9,5)	5,8	(5,7 - 5,8)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

**Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7 583,5	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

**Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	700	30,3	(24,6 - 36,6)	ns	29,7	(27,5 - 31,9)	32,6	(32,0 - 33,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### DÉPENDANCES

#### Habitudes de vie et comportements

##### Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois au cours d'une année, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus	N/D	21,4			21,4	(18,4 - 24,7)	21,2	(20,4 - 22,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	1 100	44,5	(39,8 - 49,4)		45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
<b>Total feux rouges et jaunes</b>	<b>200</b>	<b>8,8</b>	<b>ns</b>		<b>8,1</b>		<b>6,2</b>	
En émergence (feux jaunes)	100	* 4,4	(2,7 - 6,9)		3,7	(3,2 - 4,4)	3,3	(3,1 - 3,5)
Problématique (feux rouges)	100	** 4,4	(2,6 - 7,4)		4,4	(3,6 - 5,3)	2,9	(2,7 - 3,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS						Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC
Consommateurs actuels de drogues	6 900	12,3	(9,1 - 16,4)		ns	* 14,2	(10,5 - 19,0)	ns	15,5	(13,8 - 17,3)
Cannabis seulement	6 200	* 11,1	(8,1 - 15,0)		ns	* 12,8	(9,2 - 17,4)	ns	14,1	(12,5 - 15,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Condamnations liées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	Tx p. 100 000	IC		Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Taux pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329			329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

**Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Participé à au moins un jeu de hasard et d'argent	N/D	70,4	70,4	(66,6 - 74,1)	63,8	(62,8 - 64,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS du Centre-de-la-Mauricie

### SANTÉ MENTALE

#### Environnement social

##### Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Très satisfaits de sa vie sociale	28 500	51,1	(45,9 - 56,3)	ns	49,9	(44,4 - 55,4)	ns	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

#### État de santé physique - maladies chroniques

##### Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 300	** 2,5	(1,2 - 5,1)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

##### Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques de santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## État de santé psychosociale ou mentale

### Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC	% brut	IC	% ajusté	IC				
Ensemble des troubles mentaux	8 510	13,6	(13,2 - 14,0)	(+)	13,4	(13,0 - 13,8)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	4 715	7,3	(7,0 - 7,6)	(+)	7,4	(7,2 - 7,7)	(+)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	350	0,5	(0,5 - 0,6)	(+)	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0	30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	2 700	* 9,0	(5,6 - 14,2)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté				
Population de 15 ans et plus	15 500	27,7	(23,0 - 33,0)	ns	28,9	(23,9 - 34,6)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	6 000	* 22,6	(16,5 - 30,1)	ns	* 24,8	(18,0 - 33,1)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	9 500	32,4	(25,5 - 40,1)	ns	32,8	(25,4 - 41,1)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	800	33,7	(28,1 - 39,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

### Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	1 600	** 3,0	(1,6 - 5,6)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Taux d'hospitalisation spécifique à une tentative de suicide, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des tentatives de suicide	38	5,8	(4,8 - 7,1)	(+)	6,4	(5,3 - 7,7)	(+)	6,5	(6,0 - 6,9)	4,5	(4,4 - 4,6)
Hommes	15	4,6	(3,4 - 6,3)	ns	4,9	(3,6 - 6,6)	ns	5,1	(4,6 - 5,6)	3,6	(3,5 - 3,7)
Femmes	23	7,0	(5,5 - 9,0)	(+)	7,9	(6,2 - 10,2)	(+)	7,9	(7,3 - 8,6)	5,5	(5,3 - 5,6)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

### Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012 à 2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	13	20,7	(16,1 - 26,6)	(+)	19,9	(15,6 - 25,4)	(+)	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Expérience de soins

### Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	8,4	(5,5 - 11,3)	(-)	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

### Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	13,9	(10,3 - 17,6)	(+)	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	39,9	(34,6 - 45,1)	(+)	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011



## Disponibilité géographique

RLS Réseau local de services  
RSS Région sociosanitaire

## Indicateurs

### Incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental

### Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue

feu jaune (14 à 19 points) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes en émergence de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention de première ligne est jugée  
feu rouge (20 points et plus) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes évidents de consommation de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention spécialisée est

### Latitude décisionnelle faible au travail

Une latitude décisionnelle faible au travail correspond davantage aux situations où les travailleurs accomplissent les mêmes choses, ont moins de liberté de décision dans l'accomplissement des

### Problèmes de santé de longue durée

Les problèmes de santé de longue durée correspondent aux problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus, diagnostiqués par

### Sécurité alimentaire

Alimentation non précaire	sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
Alimentation modérément précaire	insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
Alimentation sévèrement précaire	insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).



*Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de la Mauricie-et-  
du-Centre-du-Québec*

Québec 

**CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE  
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE  
LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC**

**Centre administratif Bonaventure**

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

[www.ciusssmcq.ca](http://www.ciusssmcq.ca)