




Un regard averti

sur l'état de santé de la population
de la Mauricie et du Centre-du-Québec



Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Vallée de la Batiscan

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle
Juin 2019

ÉQUIPE SURVEILLANCE

Sylvie Bernier, Frédéric Lemay, Yves Pepin et Fortuné Sossa

TABLEAUX DES INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉPARTIS SELON LES PROGRAMMES SERVICES

Ce fichier Excel présente par programme services (tels que définis par l'architecture des services de santé et des services sociaux du MSSS), les indicateurs retenus pour les portraits de santé produits pour le plan annuel du CIUSSS pouvant concerner le programme. Les onglets présentent aussi la disponibilité de l'indicateur au niveau géographique (régional ou locale) et sa fréquence de mise à jour.

Contenu des portraits

Les indicateurs retenus sont tirés pour l'essentiel du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants et ils se retrouvent pour l'essentiel à l'Infocentre national de santé publique.

Les indicateurs du Plan national de surveillance sont ceux convenus par la table de concertation nationale de surveillance (TCNS) et les autres tables thématiques de Santé publique (TCNMI, TCNSE, TCNST). Il s'agit des indicateurs de l'état de santé et de ses déterminants qui ont été convenus de suivre dans le temps pour répondre à l'obligation légale des directeurs de santé publique d'élaborer des plans de surveillance.

Il s'agit d'indicateurs populationnels davantage en lien avec la prévention/promotion en santé publique. Il ne s'agit pas du portrait des clientèles. Dans ce contexte, certains programmes services auront peu d'indicateurs propres (ex : TDI-TED).

Les sources

Les sources de données sont multiples, certaines sont annuelles (naissances, mortinaissances, décès, hospitalisations) et produites par le MSSS, mais elles demandent toutes d'être validées et que le fichier soit fermé avant d'être utilisées, ainsi il ne s'agit pas de données en temps réel. Des retards sont fréquents. De plus, le fichier des tumeurs (FiTQ) n'est plus produit et le Registre québécois des cancers ne permet pas encore de produire des indicateurs sur une période d'années suffisante. D'autres sources exigeant un jumelage de fichiers (SISMACQ ou les grossesses) sont aussi produites annuellement, mais peuvent présenter des délais de production.

Les autres sources de données proviennent soit d'autres ministères (SAAQ, MEES, MSP, etc.) à leur fréquence propre, soit du Recensement (aux 5 ans), soit d'enquêtes : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), etc. Ces enquêtes sont à fréquence variable (aux 2 ans en continu pour l'ESCC, aux 5 ou 6 ans pour l'EQSP ou l'EQSJS ou parfois ponctuelles) et portent sur des années différentes. Le contenu de ces enquêtes (ENM, ESCC, EQSP) peut aussi varier même si elles sont répétées et affecter la fréquence de production des indicateurs.

De façon générale, un portrait ne peut donc pas techniquement être produit pour une même unité de temps ou à une fréquence annuelle. Les portraits sont réalisés à une fréquence d'au maximum 5 ans, pour permettre d'interpréter une évolution avec un maximum d'information à jour. De fait, même si certaines sources sont mises à jour annuellement, les mesures les utilisant portent généralement sur 5 ans pour assurer une puissance statistique aux indicateurs produits à l'échelle d'une région ou d'un RLS.

La mise à jour annuelle reste toutefois réalisable pour certains indicateurs sous forme de tableaux de bord, qui pourraient être produits par l'Infocentre du CIUSSS si cette fréquence s'avère incontournable.

Table des matières

	Pages
Général	4 à 10
Santé physique	11 à 17
Santé publique	18 à 26
Services généraux	27 à 31
Perte d'autonomie liée au vieillissement	32 à 36
Déficiences physiques	37 à 38
DI TED	39
Jeunes en difficulté	40 à 41
Dépendances	42 à 43
Santé mentale	44 à 47
Lexique	48

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

GÉNÉRAL

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS			% RLS sur la population régionale
	Hommes	Femmes	Total	
Population totale	13 264	12 554	25 818	5,0
0-17 ans	2 058	1 920	3 978	
0-5 ans	678	655	1 333	
6-11 ans	719	673	1 392	
12-17 ans	661	592	1 253	
18-64 ans	7 464	6 945	14 409	
18-24 ans	720	643	1 363	
25-44 ans	2 654	2 501	5 155	
45-64 ans	4 090	3 801	7 891	
65 ans et +	3 742	3 689	7 431	
65-74 ans	2 314	2 009	4 323	
75-84 ans	1 045	1 080	2 125	
85 ans et +	383	600	983	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Hommes	13 264			
0-17 ans	2 058	15,5	17,9	19,3
18-64 ans	7 464	56,3	59,8	62,8
65 ans et +	3 742	28,2	22,4	17,9
65-74 ans	2 314	17,4	13,7	10,8
75 ans et +	1 428	10,8	8,7	7,0
Femmes	12 554			
0-17 ans	1 920	15,3	16,9	18,4
18-64 ans	6 945	55,3	57,3	60,7
65 ans et +	3 689	29,4	25,8	21,0
65-74 ans	2 009	16,0	13,7	11,2
75 ans et +	1 680	13,4	12,1	9,8

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019 (suite)

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	25 818			
0-17 ans	3 978	15,4	17,4	18,8
18-64 ans	14 409	55,8	58,6	61,7
65 ans et +	7 431	28,8	24,1	19,4
65-74 ans	4 323	16,7	13,7	11,0
75 ans et +	3 108	12,0	10,4	8,4

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2024

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	26 015			
0-17 ans	4 127	15,9	17,8	19,4
18-64 ans	13 214	50,8	54,5	58,6
65 ans et +	8 674	33,3	27,8	22,1
65-74 ans	4 852	18,7	15,1	12,0
75 ans et +	3 822	14,7	12,7	10,1

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014 à 2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		0,8	2,1	4,0
0-17 ans		4,5	3,0	5,7
18-64 ans		-7,3	-3,6	-0,3
65 ans et +		18,6	18,6	18,2

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019 à 2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	197	0,8	2,0	3,6
0-17 ans	149	3,7	4,3	6,3
18-64 ans	-1 195	-8,3	-5,1	-1,8
65 ans et +	1 243	16,7	17,6	17,8

Taux d'accroissement naturel, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Δ	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	-192	-1,5	(-1,3 — -1,7)	(-)	0,3	(0,3 - 0,3)	2,9	(2,9 - 2,9)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%		%		%
Population ayant une identité autochtone	265	1,1		2,2		2,3

Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Fécondité, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		IC			IC		IC	
Nombre moyen de naissances	216							
Indice synthétique de fécondité		1,81		(+)	1,71		1,57	
Âge moyen des mères		29,1	(28,8 - 29,4)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		51,6	(48,6 - 54,8)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	4	* 8,1	(5,3 - 12,4)	ns	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	32	60,1	(51,5 - 70,2)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	81	144,2	(130,9 - 158,9)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	70	104,6	(94,2 - 116,2)	ns	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	24	37,0	(30,9 - 44,3)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	4	* 7,6	(4,9 - 11,6)	ns	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	----	----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Conditions socioculturelles

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	2 175						
% familles biparentales	1 630	74,9	(-)	72,5		75,4	
% familles monoparentales	540	24,8	ns	27,5		24,6	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	870	21,9	(+)	24,0		21,4	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de la population en ménage privé de 15 ans et plus vivant seule, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Population vivant seule	4 065	19,1	(+)	16,7	14,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Conditions socioéconomiques
Scolarité des 25-64 ans, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Plus haut diplôme atteint					
Population de 25 à 64 ans	13 085				
Inférieur au certificat d'études secondaires	2 080	15,9	(+)	16,6	13,3
Certificat d'études secondaires seulement	2 535	19,4	(+)	19,0	18,5
Études postsecondaires inférieures au bacc.	6 965	53,2	(+)	49,1	42,7
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	1 505	11,5	(-)	15,3	25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Taux d'emploi, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(-)	%	%
Taux d'emploi	10 395	48,9	(-)	55,6	59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Taux de chômage, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(+)	%	%
Taux de chômage	1 085	9,5	(+)	7,1	7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2016

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%	(-)	%	%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	1 705	6,9	(-)	11,5	13,0
Hommes	865	6,9	(-)	10,8	12,4
Femmes	845	7,0	(-)	12,2	13,7
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	1 030	4,2	(-)	7,1	9,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Taux de prestataires d'assistance sociale, 2018

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%			%	IC	%	IC
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)	1 204	6,5	(6,1 - 6,9)	(+)	7,9	(7,8 - 8,0)	5,9	(5,9 - 5,9)

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire

Proportion de la population de 65 ans et plus en ménage privé bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		%	
Taux de bénéficiaires	3 225	52,3	(+)	47,1		39,0	

Source : Statistique Canada, recensement du Canada, 2016

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Sécurité alimentaire	N/D	93,6		93,6	(92,0 - 94,9)	92,6	(92,1 - 93,2)
Insécurité alimentaire modérée	N/D	4,0		4,0	(3,0 - 5,4)	4,9	(4,5 - 5,4)
Insécurité alimentaire grave	N/D	* 2,4		* 2,4	(1,6 - 3,5)	2,4	(2,1 - 2,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS					Région		Québec			
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Très satisfaits de sa vie sociale	11 800	53,3	(48,2 - 58,4)	(+)	54,0	(48,5 - 59,5)	(+)	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Très faible sentiment d'appartenance	N/D	6,6		6,6	(5,3 - 8,2)	8,8	(8,2 - 9,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Vulnérables dans au moins un domaine	60	24,9	(19,4 - 31,4)	ns	26,0	(24,8 - 27,3)	27,7	(27,3 - 28,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

État de santé globale
Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	% ajustée	IC	% ajustée	IC
Excellente ou très bonne santé	12 300	55,4	(49,9 - 60,9)	ns	56,8	(51,1 - 62,4)	56,4	(55,8 - 57,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	2 400	* 11,0	(8,1 - 14,8)	ns	* 10,0	(7,3 - 13,6)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	800	** 13,6	(8,0 - 22,3)	ns			18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Espérance de vie à la naissance, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	80,8	(79,6 - 82,0)	ns		79,6	(79,4 - 79,9)	80,3	(80,3 - 80,4)
Féminin	85,8	(84,8 - 86,8)	(+)		83,9	(83,6 - 84,1)	84,3	(84,2 - 84,3)
Total	83,2	(82,4 - 84,0)	(+)		81,8	(81,6 - 82,0)	82,4	(82,3 - 82,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006

	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	66,0	(64,8 - 67,2)	ns		66,3	(66,0 - 66,5)	66,4	(66,3 - 66,5)
Féminin	68,6	(67,6 - 69,5)	ns		68,4	(68,2 - 68,6)	68,2	(68,2 - 68,3)
Total	67,3	(66,5 - 68,1)	ns		67,3	(67,1 - 67,5)	67,3	(67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	1	** 4,6	(1,9 - 11,1)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	1	** 5,5	(2,5 - 12,3)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant un médecin de famille	N/D	84,7	(80,5 - 88,6)	(+)	84,7	(83,0 - 86,3)	78,7	(78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Vallée de la Batiscan

SANTÉ PHYSIQUE

Conditions démographiques

Fécondité, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	IC		Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Nombre moyen de naissances	216							
Indice synthétique de fécondité		1,81		(+)	1,71		1,57	
Âge moyen des mères		29,1	(28,8 - 29,4)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		51,6	(48,6 - 54,8)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	4	* 8,1	(5,3 - 12,4)	ns	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	32	60,1	(51,5 - 70,2)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	81	144,2	(130,9 - 158,9)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	70	104,6	(94,2 - 116,2)	ns	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	24	37,0	(30,9 - 44,3)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	4	* 7,6	(4,9 - 11,6)	ns	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	IC		Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux d'IVG	N/D	8,6			8,6	(8,3 - 8,9)	12,6	(12,5 - 12,7)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

	RLS					Région			Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC	%		Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%
Taux pour 10 000 personnes											
Total des hospitalisations	2 296	773,9	(748,4 - 800,4)	ns	100,0	854,3	(848,4 - 860,2)	100,0	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0
Tumeurs	186	52,2	(46,5 - 58,6)	(-)	8,1	57,6	(56,2 - 59,1)	7,3	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5
Maladies de l'appareil circulatoire	401	104,7	(96,9 - 113,2)	ns	17,5	117,7	(115,7 - 119,8)	15,9	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	261	75,9	(68,7 - 83,8)	(-)	11,4	101,8	(99,8 - 103,8)	12,7	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1
Maladies de l'appareil digestif	202	66,2	(59,2 - 74,2)	(-)	8,8	78,0	(76,2 - 79,8)	9,2	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	220	72,7	(65,2 - 81,0)	(+)	9,6	76,8	(75,1 - 78,6)	9,2	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1
Grossesse, accouchements et puerpéralité	234	127,4	(115,5 - 140,4)	(+)	10,2	113,2	(110,8 - 115,6)	10,3	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Population ayant une incapacité	3 555	14,4	(+)		14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS					Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC	ns		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	1	** 90,4	(37,6 - 217,1)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)	
5-14 ans	np	----	----	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)	
15-24 ans	np	----	----	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)	
25-44 ans	4	* 72,3	(45,5 - 114,7)	ns	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)	
45-64 ans	37	421,9	(365,4 - 487,1)	ns	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)	
65-74 ans	47	1 312,2	(1 154,0 - 1 491,9)	ns	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)	
75 ans et +	166	6 059,3	(5 660,8 - 6 485,8)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)	
Tous (brut)	255	996,8	(943,5 - 1 053,0)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)	
Total (ajusté)	255	690,5	(653,1 - 730,1)	ns	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)	

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	86	233,2	(211,9 - 256,7)	ns	334,3	(304,1 - 367,6)	(+)	244,4	(238,9 - 249,9)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	65	171,4	(153,7 - 191,2)	ns	253,9	(227,7 - 283,0)	(+)	177,1	(172,5 - 181,8)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	30	77,1	(65,6 - 90,5)	ns	117,2	(99,8 - 137,5)	(+)	85,0	(81,8 - 88,2)	73,1	(72,3 - 73,9)
Traumatismes non intentionnels	12	38,4	(29,4 - 50,2)	(+)	46,1	(35,7 - 59,5)	(+)	31,3	(29,3 - 33,4)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	8	22,5	(16,6 - 30,5)	ns	32,8	(24,2 - 44,4)	ns	29,9	(28,0 - 31,9)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	9	24,3	(18,3 - 32,4)	ns	36,7	(27,6 - 48,9)	(+)	19,4	(17,9 - 21,0)	23,8	(23,3 - 24,3)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	6	* 15,2	(10,6 - 21,9)	ns	* 22,7	(15,7 - 32,6)	ns	14,9	(13,6 - 16,2)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS					Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns		%	IC	%	IC
Surpoids	12 800	59,9	(54,4 - 65,1)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)	
Obésité	3 800	18,0	(14,4 - 22,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Migraines (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,3 - 8,4)	9,0	(8,4 - 9,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Hommes	N/D	** 1,1	** 1,1	(0,5 - 2,5)	2,9	(2,3 - 3,7)
Femmes	N/D	* 14,0	* 14,0	(10,3 - 18,7)	12,1	(11,2 - 13,1)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	ns	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence des cardiopathies ischémiques	2 420	7,2	(6,8 - 7,6)	ns	11,6	(11,0 - 12,2)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	800	2,8	(2,5 - 3,1)	ns	3,8	(3,5 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	(-)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'asthme	1 900	8,3	(7,8 - 8,9)	(-)	7,6	(7,2 - 8,1)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	1 705	7,5	(7,0 - 8,1)	(-)	9,8	(9,2 - 10,4)	ns	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	5 910	18,7	(18,0 - 19,4)	(-)	28,2	(27,3 - 29,2)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète	2 335	7,4	(7,0 - 7,9)	(-)	11,2	(10,6 - 11,8)	(+)	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	165	530,8	(495,5 - 568,7)	(-)	663,9	(620,1 - 710,8)	(+)	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	21	65,9	(54,3 - 79,9)	ns	84,5	(69,8 - 102,3)	ns	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	4	* 11,9	(7,6 - 18,7)	ns	* 15,3	(9,8 - 24,0)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	3	* 10,3	(6,3 - 16,8)	ns	* 12,9	(7,9 - 21,0)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	28	90,0	(76,3 - 106,2)	ns	114,3	(96,9 - 134,7)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	20	129,4	(105,7 - 158,5)	ns	160,5	(131,7 - 195,7)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	18	115,9	(94,0 - 142,9)	ns	139,2	(112,9 - 171,5)	ns	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	8	24,6	(17,8 - 33,9)	ns	30,6	(22,3 - 42,0)	(+)	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	9	27,5	(20,3 - 37,1)	ns	34,6	(25,7 - 46,7)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	5	* 15,5	(10,3 - 23,2)	ns	* 19,3	(12,9 - 28,8)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	6	* 19,2	(13,4 - 27,6)	ns	* 24,1	(16,9 - 34,5)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	9	23,5	(17,5 - 31,7)	ns	34,4	(25,6 - 46,2)	ns	28,5	(26,7 - 30,5)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	2	* 7,0	(3,9 - 12,5)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	5,9	(5,1 - 6,9)	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	5	* 13,4	(8,9 - 20,3)	ns	* 18,7	(12,6 - 28,0)	ns	14,0	(12,8 - 15,4)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	5	* 26,5	(17,6 - 40,0)	ns	* 35,1	(23,3 - 52,9)	(+)	22,4	(20,0 - 25,1)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	4	* 25,8	(16,5 - 40,4)	ns	* 33,6	(21,9 - 51,5)	ns	23,4	(21,1 - 25,9)	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	26	70,5	(59,3 - 83,9)	ns	101,6	(85,5 - 120,6)	(+)	78,4	(75,3 - 81,5)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	3	* 8,4	(5,1 - 13,8)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	8,1	(7,2 - 9,2)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	3	* 7,1	(4,1 - 12,2)	ns	* 10,2	(5,9 - 17,5)	ns	9,6	(8,6 - 10,8)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Cardiopathies ischémiques	32	85,2	(72,9 - 99,5)	ns	125,8	(107,8 - 146,8)	(+)	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	13	33,8	(26,5 - 43,2)	ns	50,8	(39,8 - 64,7)	ns	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	12	32,4	(25,2 - 41,7)	ns	47,7	(37,1 - 61,2)	(+)	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	3	* 8,3	(5,1 - 13,5)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	8	21,5	(15,9 - 29,2)	32,8	(24,2 - 44,4)	29,1	(27,3 - 31,0)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	16	40,8	(32,7 - 50,9)	61,7	(49,5 - 76,9)	39,5	(37,4 - 41,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Maladies du foie	2	* 6,5	(3,7 - 11,5)	* 9,4	(5,3 - 16,5)	9,9	(8,8 - 11,0)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Insuffisance rénale	4	* 11,0	(7,2 - 16,9)	* 16,4	(10,7 - 25,2)	9,5	(8,5 - 10,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	14	6,5	(5,0 - 8,0)	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Naissances prématurées	15	6,9	(5,4 - 8,4)	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013 à 2017

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	19	9,2	(7,5 - 11,0)	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	1	** 4,6	(1,9 - 11,1)	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012 à 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	1	** 5,5	(2,5 - 12,3)	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	2 300	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 11,6	(8,4 - 15,8)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	6 700	32,9	(27,7 - 38,1)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)		30,3			(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	125	82,0	(63,5 - 104,3)	ns	84,0	(65,9 - 105,4)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	5	* 16,5	(10,8 - 25,3)	(+)	* 18,0	(11,9 - 27,0)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	4	* 13,1	(8,1 - 21,2)	(+)	* 14,1	(8,9 - 22,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	4	* 11,4	(7,4 - 17,7)	ns	* 16,4	(10,7 - 25,2)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	2	* 6,3	(3,6 - 11,1)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	2	** 5,1	(2,6 - 10,2)	ns	* 7,0	(3,7 - 13,5)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	4				* 60,4	(38,5 - 94,7)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	157	51,7	(46,9 - 57,1)	(+)	61,3	(55,9 - 67,2)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	14	6,0	(4,3 - 8,3)	(+)	5,4	(3,9 - 7,3)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	97	27,3	(24,1 - 31,0)	(-)	37,8	(33,6 - 42,5)	ns	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	21	9,3	(7,2 - 12,1)	(+)	8,3	(6,4 - 10,6)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

État de santé physique - maladies infectieuses

Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	60	233,2	(181,1 - 300,3)	(-)	368,2	(352,0 - 385,1)		316,5			(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin	N/D	78,3	(73,4 - 82,8)	ns	75,7	(73,9 - 77,5)	75,0	(74,5 - 75,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit	N/D	*11,6	(7,4 - 16,0)	ns	9,5	(7,9 - 11,1)	11,0	(10,6 - 11,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un spécialiste à la suite d'une référence	N/D	28,7	(23,7 - 33,5)	ns	27,6	(25,7 - 29,5)	30,5	(30,0 - 31,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 8,1	(5,4 - 10,9)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	22,5	(18,1 - 27,1)	ns	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

SANTÉ PUBLIQUE

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Conditions socioéconomiques

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	300	31,2	(24,2 - 39,3)	(+)	20,3	(17,7 - 23,2)	17,5	(16,8 - 18,3)
Garçons	200	40,4	(30,4 - 51,3)	(+)	25,0	(21,6 - 28,7)	21,3	(20,3 - 22,3)
Filles	100	* 20,6	(14,9 - 27,7)	(+)	15,4	(12,9 - 18,2)	13,6	(12,8 - 14,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Taux annuel d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (RLS de résidence), 2011-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	25	11,2	(8,8 - 13,6)	(-)	15,4	(14,8 - 16,0)	15,2	(15,1 - 15,4)
Garçons	15	13,7	(10,0 - 17,4)	(-)	19,2	(18,2 - 20,1)	18,7	(18,4 - 18,9)
Filles	10	8,8	(5,8 - 11,9)	(-)	11,8	(11,1 - 12,6)	12,0	(11,8 - 12,2)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MEES)

Environnement physique

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%			%	IC	%	IC
Exposition fumée secondaire	N/D	* 6,2			* 6,2	(4,5 - 8,3)	4,8	(4,3 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Logements avec réparations majeures	995	8,4	(+)	6,0		6,4	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Fortement dérangé par le bruit à domicile	3 200	14,3	(11,0 - 18,4)	ns	12,6	(11,2 - 14,2)	16,4	(15,9 - 16,8)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2016, Institut de la statistique du Québec

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Élèves victimisés	300	34,5	(28,8 - 40,7)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes	N/D	60,6			60,6	(57,5 - 63,6)	61,4	(60,5 - 62,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Nombre de portions minimales de fruits et légumes	200	22,7	(18,6 - 27,4)	ns	22,6	(20,8 - 24,5)	25,6	(24,9 - 26,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC			
Au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou p	5 000	22,4	(18,4 - 26,9)	ns	24,0	(19,6 - 29,0)	(+)	22,7	(20,9 - 24,6)	19,0	(18,6 - 19,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2013-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif	N/D	37,2			37,2	(33,2 - 41,1)	40,1	(39,0 - 41,3)
12-17 ans, très actifs	N/D	np			np	-----	43,5	(39,4 - 47,5)
Garçons	N/D	np			np	-----	51,0	(45,4 - 56,6)
Filles	N/D	np			np	-----	35,4	(29,7 - 41,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

np : du fait d'un fort coefficient de variation, la donnée régionale n'est pas présentée

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	200	24,7	(19,9 - 30,2)	(-)	32,4	(29,8 - 35,1)	31,8	(31,0 - 32,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Fumeurs actuels	4 000	17,9	(14,1 - 22,4)	ns	18,9	(14,7 - 23,9)	19,3	(18,8 - 19,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Entre 5 et 11 ans	N/D	** 3,0	** 3,0	(1,3 - 6,8)	1,7	(1,3 - 2,2)
Entre 12 et 14 ans	N/D	* 14,4	* 14,4	(10,2 - 20,1)	15,9	(14,2 - 17,8)
Entre 15 et 19 ans	N/D	61,1	61,1	(52,6 - 69,0)	53,7	(51,1 - 56,3)
20 ans et plus	N/D	* 21,5	* 21,5	(15,7 - 28,7)	28,7	(26,3 - 31,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fumeurs actuels	100	* 7,6	(4,7 - 12,0)	(+)	4,7	(3,7 - 5,9)	3,1	(2,8 - 3,3)
Fumeurs débutants	0	* 4,7	(3,0 - 7,3)	(+)	2,7	(2,1 - 3,3)	2,4	(2,2 - 2,6)
Non-Fumeurs	800	87,7	(82,5 - 91,5)	(-)	92,7	(91,2 - 93,9)	94,6	(94,2 - 94,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	400	50,0	(42,4 - 57,5)	(+)	45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation actuel de cannabis	200	28,4	(23,2 - 34,1)	(+)	22,5	(20,7 - 24,4)	18,2	(17,6 - 18,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	12 500	81,6	(75,9 - 86,1)	(+)	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2013-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	4 800	59,7	(51,4 - 67,4)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	2 980	68,2	(66,3 - 70,0)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	20 100	93,6	(90,3 - 95,8)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de cyclistes portant un casque à bicyclette, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Port du casque	N/D	29,3	29,3	(23,9 - 34,7)	42,4	(40,7 - 44,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Non-utilisation de la ceinture	N/D	10,8	10,8		9,9	

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329	329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

État de santé globale

Taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	1	** 90,4	(37,6 - 217,1)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	np	-----	-----	ns	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	np	-----	-----	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	4	* 72,3	(45,5 - 114,7)	ns	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	37	421,9	(365,4 - 487,1)	ns	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	47	1 312,2	(1 154,0 - 1 491,9)	ns	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	166	6 059,3	(5 660,8 - 6 485,8)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	255	996,8	(943,5 - 1 053,0)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	255	690,5	(653,1 - 730,1)	ns	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	86	233,2	(211,9 - 256,7)	ns	334,3	(304,1 - 367,6)	244,4	(238,9 - 249,9)
Maladies de l'appareil circulatoire	65	171,4	(153,7 - 191,2)	ns	253,9	(227,7 - 283,0)	177,1	(172,5 - 181,8)
Maladies de l'appareil respiratoire	30	77,1	(65,6 - 90,5)	ns	117,2	(99,8 - 137,5)	85,0	(81,8 - 88,2)
Maladies du système nerveux	14	36,4	(28,7 - 46,1)	(-)	54,7	(43,3 - 69,1)	59,9	(57,2 - 62,6)
Troubles mentaux et du comportement	12	30,8	(23,8 - 39,8)	(-)	46,1	(35,7 - 59,5)	37,1	(35,1 - 39,3)
Traumatismes non intentionnels	12	38,4	(29,4 - 50,2)	(+)	46,1	(35,7 - 59,5)	31,3	(29,3 - 33,4)
Maladies de l'appareil digestif	8	22,5	(16,6 - 30,5)	ns	32,8	(24,2 - 44,4)	29,9	(28,0 - 31,9)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	9	24,3	(18,3 - 32,4)	ns	36,7	(27,6 - 48,9)	19,4	(17,9 - 21,0)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	3	* 8,6	(5,3 - 14,1)	(-)	* 12,5	(7,7 - 20,4)	15,4	(14,1 - 16,8)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	6	* 15,2	(10,6 - 21,9)	ns	* 22,7	(15,7 - 32,6)	14,9	(13,6 - 16,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Populaton édentée	3 900	14,4	(11,8 - 17,6)	(+)	17,7	(14,4 - 21,7)	13,8	(12,6 - 15,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	12 800	59,9	(54,4 - 65,1)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	3 800	18,0	(14,4 - 22,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	400	** 1,7	(0,8 - 3,9)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	5 910	18,7	(18,0 - 19,4)	(-)	28,2	(27,3 - 29,2)	(+)	19,1 (19,0 - 19,3)	19,8 (19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 1 an et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	10	--	--		*0,2	(0,1 - 0,5)	ns	0,3 (0,2 - 0,3)	0,3 (0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	2 335	7,4	(7,0 - 7,9)	(-)	11,2	(10,6 - 11,8)	(+)	7,6 (7,5 - 7,7)	8,0 (7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	165	530,8	(495,5 - 568,7)	(-)	663,9	(620,1 - 710,8)	(+)	525,8 (517,4 - 534,3)	531,4 (529,2 - 533,7)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	21	65,9	(54,3 - 79,9)	ns	84,5	(69,8 - 102,3)	ns	69,4 (66,4 - 72,5)	68,7 (67,9 - 69,5)
Cancer du pancréas	4	* 11,9	(7,6 - 18,7)	ns	* 15,3	(9,8 - 24,0)	ns	12,8 (11,6 - 14,2)	13,7 (13,3 - 14,0)
Cancer de l'estomac	3	* 10,3	(6,3 - 16,8)	ns	* 12,9	(7,9 - 21,0)	ns	8,6 (7,6 - 9,8)	10,1 (9,8 - 10,4)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	28	90,0	(76,3 - 106,2)	ns	114,3	(96,9 - 134,7)	(+)	94,5 (91,1 - 98,2)	90,5 (89,6 - 91,4)
Cancer du sein chez la femme	20	129,4	(105,7 - 158,5)	ns	160,5	(131,7 - 195,7)	ns	63,5 (60,6 - 66,5)	68,9 (68,1 - 69,7)
Cancer de la prostate	18	115,9	(94,0 - 142,9)	ns	139,2	(112,9 - 171,5)	ns	125,9 (120,0 - 132,2)	120,1 (112,5 - 115,5)
Cancer du rein	8	24,6	(17,8 - 33,9)	ns	30,6	(22,3 - 42,0)	(+)	15,8 (14,4 - 17,4)	16,0 (15,6 - 16,4)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	9	27,5	(20,3 - 37,1)	ns	34,6	(25,7 - 46,7)	ns	28,7 (26,8 - 30,7)	28,2 (27,7 - 28,7)
Leucémies	5	* 15,5	(10,3 - 23,2)	ns	* 19,3	(12,9 - 28,8)	ns	12,3 (11,1 - 13,7)	13,5 (13,2 - 13,9)
Lymphomes non hodgkiniens	6	* 19,2	(13,4 - 27,6)	ns	* 24,1	(16,9 - 34,5)	ns	19,0 (17,5 - 20,7)	19,8 (19,3 - 20,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	9	23,5	(17,5 - 31,7)	ns	34,4	(25,6 - 46,2)	ns	28,5 (26,7 - 30,5)	28,7 (28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	2	* 7,0	(3,9 - 12,5)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	5,9 (5,1 - 6,9)	6,4 (6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	5	* 13,4	(8,9 - 20,3)	ns	* 18,7	(12,6 - 28,0)	ns	14,0 (12,8 - 15,4)	13,7 (13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	5	* 26,5	(17,6 - 40,0)	ns	* 35,1	(23,3 - 52,9)	(+)	22,4 (20,0 - 25,1)	23,8 (23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	4	* 25,8	(16,5 - 40,4)	ns	* 33,6	(21,9 - 51,5)	ns	23,4 (21,1 - 25,9)	28,7 (28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	26	70,5	(59,3 - 83,9)	ns	101,6	(85,5 - 120,6)	(+)	78,4 (75,3 - 81,5)	72,6 (71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	3	* 8,4	(5,1 - 13,8)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	8,1 (7,2 - 9,2)	7,9 (7,6 - 8,1)
Leucémie	3	* 7,1	(4,1 - 12,2)	ns	* 10,2	(5,9 - 17,5)	ns	9,6 (8,6 - 10,8)	8,7 (8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nb	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	32	85,2	(72,9 - 99,5)	ns	125,8	(107,8 - 146,8)	(+)	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	13	33,8	(26,5 - 43,2)	ns	50,8	(39,8 - 64,7)	ns	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	12	32,4	(25,2 - 41,7)	ns	47,7	(37,1 - 61,2)	(+)	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	3	* 8,3	(5,1 - 13,5)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nb	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	8	21,5	(15,9 - 29,2)	ns	32,8	(24,2 - 44,4)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	16	40,8	(32,7 - 50,9)	ns	61,7	(49,5 - 76,9)	(+)	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Nb	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	14	6,5	(5,0 - 8,0)	ns	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	Nb	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	19	9,2	(7,5 - 11,0)	ns	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Nb	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC		Région		Québec	
								% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	2 300	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 11,6	(8,4 - 15,8)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nb	Taux ajusté	RLS			Région		Québec			
			IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Accident de transport	5	* 16,5	(10,8 - 25,3)	(+)	* 18,0	(11,9 - 27,0)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	4	* 13,1	(8,1 - 21,2)	(+)	* 14,1	(8,9 - 22,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	4	* 11,4	(7,4 - 17,7)	ns	* 16,4	(10,7 - 25,2)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	2	* 6,3	(3,6 - 11,1)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	2	** 5,1	(2,6 - 10,2)	ns	* 7,0	(3,7 - 13,5)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	4				* 60,4	(38,5 - 94,7)	ns	Taux brut	IC brut	Taux brut	IC brut
								75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	Nb	Taux ajusté	RLS			Région		Québec			
			IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	157	51,7	(46,9 - 57,1)	(+)	61,3	(55,9 - 67,2)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	14	6,0	(4,3 - 8,3)	(+)	5,4	(3,9 - 7,3)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	97	27,3	(24,1 - 31,0)	(-)	37,8	(33,6 - 42,5)	ns	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	68	--	--		104,0	(90,4 - 119,6)	(-)	153,3	(150,0 - 156,6)	134,3	(133,5 - 135,2)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	21	9,3	(7,2 - 12,1)	(+)	8,3	(6,4 - 10,6)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

État de santé physique - maladies infectieuses
Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	Nb	RLS			Région		Québec	
		Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	60	233,2	(181,1 - 300,3)	(-)	368,2	(352,0 - 385,1)	316,5	(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

État de santé psychosociale ou mentale
Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3		3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8		21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0		30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Travailleurs vivant de la tension au travail	1 400	* 12,0	(7,9 - 17,8)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté				
Population de 15 ans et plus	6 200	27,8	(23,0 - 33,2)	ns	29,1	(24,0 - 34,8)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	2 900	24,8	(18,6 - 32,4)	ns	26,4	(19,6 - 34,5)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	3 200	31,1	(24,3 - 38,8)	ns	31,9	(24,8 - 39,9)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	300	35,0	(29,7 - 40,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Songé sérieusement au suicide	900	** 4,2	(2,5 - 6,9)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté				
Mortalité par suicide	3	* 11,8	(7,1 - 19,7)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7583,5		7583,5	(7304,8 - 7872,9)	6090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

SERVICES GÉNÉRAUX

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	12 500	81,6	(75,9 - 86,1)	(+)	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	4 800	59,7	(51,4 - 67,4)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique	2 980	68,2	(66,3 - 70,0)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

Source : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	20 100	93,6	(90,3 - 95,8)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	12 800	59,9	(54,4 - 65,1)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	3 800	18,0	(14,4 - 22,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +)	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence des cardiopathies ischémiques	2 420	7,2	(6,8 - 7,6)	ns	11,6	(11,0 - 12,2)	(+)	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'asthme	1 900	8,3	(7,8 - 8,9)	(-)	7,6	(7,2 - 8,1)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Prévalence de la MPOC	1 705	7,5	(7,0 - 8,1)	(-)	9,8	(9,2 - 10,4)	ns	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'hypertension	5 910	18,7	(18,0 - 19,4)	(-)	28,2	(27,3 - 29,2)	(+)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète des 1-19 ans	10	--	--		*0,2	(0,1 - 0,5)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	2 335	7,4	(7,0 - 7,9)	(-)	11,2	(10,6 - 11,8)	(+)	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	165	530,8	(495,5 - 568,7)	(-)	663,9	(620,1 - 710,8)	(+)	525,8	(517,4 - 534,3)	531,4	(529,2 - 533,7)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	21	65,9	(54,3 - 79,9)	ns	84,5	(69,8 - 102,3)	ns	69,4	(66,4 - 72,5)	68,7	(67,9 - 69,5)
Cancer du pancréas	4	* 11,9	(7,6 - 18,7)	ns	* 15,3	(9,8 - 24,0)	ns	12,8	(11,6 - 14,2)	13,7	(13,3 - 14,0)
Cancer de l'estomac	3	* 10,3	(6,3 - 16,8)	ns	* 12,9	(7,9 - 21,0)	ns	8,6	(7,6 - 9,8)	10,1	(9,8 - 10,4)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	28	90,0	(76,3 - 106,2)	ns	114,3	(96,9 - 134,7)	(+)	94,5	(91,1 - 98,2)	90,5	(89,6 - 91,4)
Cancer du sein chez la femme	20	129,4	(105,7 - 158,5)	ns	160,5	(131,7 - 195,7)	ns	63,5	(60,6 - 66,5)	68,9	(68,1 - 69,7)
Cancer de la prostate	18	115,9	(94,0 - 142,9)	ns	139,2	(112,9 - 171,5)	ns	125,9	(120,0 - 132,2)	120,1	(112,5 - 115,5)
Cancer du rein	8	24,6	(17,8 - 33,9)	ns	30,6	(22,3 - 42,0)	(+)	15,8	(14,4 - 17,4)	16,0	(15,6 - 16,4)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	9	27,5	(20,3 - 37,1)	ns	34,6	(25,7 - 46,7)	ns	28,7	(26,8 - 30,7)	28,2	(27,7 - 28,7)
Leucémies	5	* 15,5	(10,3 - 23,2)	ns	* 19,3	(12,9 - 28,8)	ns	12,3	(11,1 - 13,7)	13,5	(13,2 - 13,9)
Lymphomes non hodgkiniens	6	* 19,2	(13,4 - 27,6)	ns	* 24,1	(16,9 - 34,5)	ns	19,0	(17,5 - 20,7)	19,8	(19,3 - 20,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	14	6,5	(5,0 - 8,0)	ns	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances prématurées	15	6,9	(5,4 - 8,4)	ns	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	19	9,2	(7,5 - 11,0)	ns	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	2 300	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 11,6	(8,4 - 15,8)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs	3 500	16,9	(13,1 - 21,7)	(+)	16,0	(12,5 - 20,2)	(+)	10,4	(9,0 - 11,9)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	6 700	32,9	(27,7 - 38,1)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)		30,3	(29,6 - 31,1)		

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

État de santé psychosociale ou mentale

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	2 620	10,6	(10,0 - 11,2)	(-)	10,5	(10,0 - 11,0)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	1 535	6,0	(5,6 - 6,5)	(-)	6,1	(5,7 - 6,6)	(-)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	40	0,2	(0,1 - 0,3)	(-)	0,2	(0,1 - 0,2)	(-)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région				Québec		
	Nbre	%	%	IC		%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)		24,1	(23,3 - 25,1)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	%	IC		%	IC		%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	1 400	* 12,0	(7,9 - 17,8)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)		11,7	(11,2 - 12,3)		

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS			%	Région		%	Québec			
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté		
Population de 15 ans et plus	6 200	27,8	(23,0 - 33,2)	ns	29,1	(24,0 - 34,8)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	2 900	24,8	(18,6 - 32,4)	ns	26,4	(19,6 - 34,5)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	3 200	31,1	(24,3 - 38,8)	ns	31,9	(24,8 - 39,9)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS			%	Région		%	Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	300	35,0	(29,7 - 40,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	ns	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS			%	Région		%	Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC
Songé sérieusement au suicide	900	** 4,2	(2,5 - 6,9)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	ns	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS			%	Région		%	Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		
Mortalité par suicide	3	* 11,8	(7,1 - 19,7)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009

	RLS		%	Région		%	Québec	
	Nbre	Taux		Taux	IC		Taux	IC
Taux pour 100 000 femmes	N/D	386,0		386,0	(374,3 - 398,0)		417,2	(414,1 - 420,3)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Expérience de soins
Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS			%	Région		%	Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 8,1	(5,4 - 10,9)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	ns	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	RLS			%	Région		%	Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	12,4	(8,8 - 16,2)	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	ns	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Conditions démographiques

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		0,8	2,1	4,0
65 ans et +		18,6	18,6	18,2
65-74 ans		22,3	19,0	17,7
75-84 ans		13,8	17,9	18,0
85 ans et plus		13,8	19,1	21,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Population totale	197	0,8	2,0	3,6
65 ans et +	1 243	16,7	17,6	17,8
75 ans et plus	714	23,0	24,5	24,3

Conditions socioculturelles

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	6 165	93,8 (+)	87,3	89,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Proportion de personnes de 65 ans et plus en ménage privé vivant seules, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Personnes de 65 ans et plus vivant seules	1 865	30,3	31,1	30,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

Environnement social

Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population prodiguant soins aux âgés	5 400	25,9	(+)	20,7		18,6	

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	N/D	* 15,6		* 15,6	(11,7 - 20,2)	12,2	(11,4 - 13,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé globale

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brute	IC	ns	% ajustée	IC	ns	% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	2 400	* 11,0	(8,1 - 14,8)	ns	* 10,0	(7,3 - 13,6)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	800	** 13,6	(8,0 - 22,3)	ns				18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population ayant une incapacité	3 555	14,4	(+)	14,2		13,9	
65 ans et plus	1 670	31,8	(-)	33,3		36,8	
65-74 ans	635	21,0	(-)	24,5		27,2	
75 ans et +	1 035	46,4	(-)	47,3		51,4	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut		% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9		8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)
65 ans et +	N/D	24,0		24,0	(18,3 - 29,8)	19,6	(17,9 - 21,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Maladies du système nerveux	14	36,4	(28,7 - 46,1)	(-)	54,7	(43,3 - 69,1)	ns	59,9	(57,2 - 62,6)	48,5	(47,9 - 49,2)
Maladies d'Alzheimer	8	20,4	(15,0 - 27,8)	ns	31,2	(22,9 - 42,6)	ns	39,1	(37,0 - 41,3)	27,3	(26,8 - 27,8)
Troubles mentaux et du comportement	12	30,8	(23,8 - 39,8)	(-)	46,1	(35,7 - 59,5)	ns	37,1	(35,1 - 39,3)	41,7	(41,1 - 42,3)
Troubles mentaux organiques, incluent les troubles symptomatiques	11	28,5	(22,0 - 37,1)	(-)	43,7	(33,7 - 56,8)	ns	34,3	(32,3 - 36,3)	38,9	(38,4 - 39,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	Nbre	Région		RLS	Région		Québec	
		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
45-64 ans	1 500	* 18,0	(12,5 - 25,3)	(+)	13,9	(11,7 - 16,3)	9,0	(8,6 - 9,6)
65 ans et plus	2 400	40,2	(31,3 - 49,8)	ns	41,9	(37,7 - 46,2)	33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques
Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	400	** 1,7	(0,8 - 3,9)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	N/D	40,5	40,5	(35,5 - 45,7)	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
65 ans et plus	N/D	13,5	13,5	(10,3 - 17,4)	15,5	(14,2 - 16,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	800	2,8	(2,5 - 3,1)	ns	3,8	(3,5 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	565	8,8	(7,9 - 9,8)	ns	8,6	(7,7 - 9,6)	ns	9,2	(9,0 - 9,5)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	1 705	7,5	(7,0 - 8,1)	(-)	9,8	(9,2 - 10,4)	ns	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	1 115	17,3	(16,0 - 18,7)	(-)	17,4	(16,1 - 18,8)	(-)	19,5	(19,2 - 19,9)	19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	165	530,8	(495,5 - 568,7)	(-)	663,9	(620,1 - 710,8)	(+)	525,8	(517,4 - 534,3)	531,4	(529,2 - 533,7)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	21	65,9	(54,3 - 79,9)	ns	84,5	(69,8 - 102,3)	ns	69,4	(66,4 - 72,5)	68,7	(67,9 - 69,5)
Cancer du pancréas	4	* 11,9	(7,6 - 18,7)	ns	* 15,3	(9,8 - 24,0)	ns	12,8	(11,6 - 14,2)	13,7	(13,3 - 14,0)
Cancer de l'estomac	3	* 10,3	(6,3 - 16,8)	ns	* 12,9	(7,9 - 21,0)	ns	8,6	(7,6 - 9,8)	10,1	(9,8 - 10,4)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	28	90,0	(76,3 - 106,2)	ns	114,3	(96,9 - 134,7)	(+)	94,5	(91,1 - 98,2)	90,5	(89,6 - 91,4)
Cancer du sein chez la femme	20	129,4	(105,7 - 158,5)	ns	160,5	(131,7 - 195,7)	ns	63,5	(60,6 - 66,5)	68,9	(68,1 - 69,7)
Cancer de la prostate	18	115,9	(94,0 - 142,9)	ns	139,2	(112,9 - 171,5)	ns	125,9	(120,0 - 132,2)	120,1	(112,5 - 115,5)
Cancer du rein	8	24,6	(17,8 - 33,9)	ns	30,6	(22,3 - 42,0)	(+)	15,8	(14,4 - 17,4)	16	(15,6 - 16,4)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	9	27,5	(20,3 - 37,1)	ns	34,6	(25,7 - 46,7)	ns	28,7	(26,8 - 30,7)	28,2	(27,7 - 28,7)
Leucémies	5	* 15,5	(10,3 - 23,2)	ns	* 19,3	(12,9 - 28,8)	ns	12,3	(11,1 - 13,7)	13,5	(13,2 - 13,9)
Lymphomes non hodgkiniens	6	* 19,2	(13,4 - 27,6)	ns	* 24,1	(16,9 - 34,5)	ns	19,0	(17,5 - 20,7)	19,8	(19,3 - 20,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	2 620	10,6	(10,0 - 11,2)	(-)	10,5	(10,0 - 11,0)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
65 ans et plus	640	-----	-----		10,0	(9,0 - 11,0)	(-)	13,1	(12,9 - 13,4)	13,7	(13,6 - 13,8)
65 ans et + (troubles anxiodépressif)	340	-----	-----		5,3	(4,6 - 6,1)	(-)	6,2	(6,0 - 6,4)	7,3	(7,2 - 7,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

N. B. L'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	RLS	% brut	IC brut	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 65 ans et plus	440	6,3	(5,6 - 7,2)	ns	6,9	(6,0 - 7,7)	ns	7,2	(7,0 - 7,5)	6,8	(6,7 - 6,9)
65-74 ans	55	-----	-----		1,5	(1,0 - 2,1)	ns	1,9	(1,7 - 2,0)	1,7	(1,6 - 1,7)
75-84 ans	165	-----	-----		8,9	(7,2 - 10,9)	ns	10,2	(9,7 - 10,6)	9,5	(9,4 - 9,7)
85 ans et plus	220	-----	-----		25,4	(21,2 - 30,2)	ns	28,8	(27,7 - 30,0)	27,4	(27,1 - 27,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut	ns	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	125	82,0	(63,5 - 104,3)	ns	84,0	(65,9 - 105,4)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	75	113,4	(82,2 - 152,4)	ns	116,8	(85,0 - 156,3)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut	ns	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Chutes grand total	4	* 11,4	(7,4 - 17,7)	ns	* 16,4	(10,7 - 25,2)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	2	* 6,3	(3,6 - 11,1)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	2	** 5,1	(2,6 - 10,2)	ns	* 7,0	(3,7 - 13,5)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	4				* 60,4	(38,5 - 94,7)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

DÉFICIENCE PHYSIQUE

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	(+)	%		%	
Population ayant une incapacité	3 555	14,4	(+)	14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	% brut	% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9	8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de la population ayant une surdit , population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population ayant une surdit�	4 700	21,6	(17,6 - 26,2)	18,4	(14,7 - 22,8)	15,7	(13,9 - 14,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier ma tre de l'Enqu te qu bécoise sur la sant  de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	800	2,8	(2,5 - 3,1)	ns	3,8	(3,5 - 4,2)	(+)	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté			
Victime de blessure non intentionnelle	2 300	* 10,5	(7,7 - 14,2)	ns	* 11,6	(8,4 - 15,8)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Ensemble des 45 ans et plus	125	82,0	(63,5 - 104,3)	ns	84,0	(65,9 - 105,4)	ns	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté			
Accident de transport	5	* 16,5	(10,8 - 25,3)	(+)	* 18,0	(11,9 - 27,0)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	4	* 13,1	(8,1 - 21,2)	(+)	* 14,1	(8,9 - 22,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	4	* 11,4	(7,4 - 17,7)	ns	* 16,4	(10,7 - 25,2)	ns	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	2	* 6,3	(3,6 - 11,1)	ns	* 9,4	(5,3 - 16,5)	ns	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	2	** 5,1	(2,6 - 10,2)	ns	* 7,0	(3,7 - 13,5)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	4				* 60,4	(38,5 - 94,7)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

DI-TED

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

État de santé mentale

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
Prévalence du trouble du spectre de l'autisme	40	0,8	(0,5 - 1,1)	ns	0,8	(0,5 - 1,2)	ns	0,9	(0,8 - 0,9)	1,2	(1,2 - 1,2)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

JEUNES EN DIFFICULTÉ

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	300	34,5	(28,8 - 40,7)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Violence infligée	100	29,6	(25,1 - 34,7)	(+)	24,7	(22,6 - 27,0)	24,1	(23,3 - 25,0)
Violence subie	200	35,9	(31,4 - 40,8)	ns	36,6	(34,4 - 38,8)	36,2	(35,3 - 37,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un comportement d'agressivité directe	300	37,7	(33,0 - 42,6)	ns	30,7	(28,7 - 32,7)	33,1	(32,4 - 33,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un des trois problèmes	200	25,9	(22,7 - 29,4)	(+)	19,9	(18,6 - 21,3)	19,5	(19,0 - 20,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	300	35,0	(29,7 - 40,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC				
Prévalence du TDA/H	220	4,2	(3,5 - 5,0)	ns	4,3	(3,6 - 5,2)	ns	4,8	(4,6 - 4,9)	4,2	(4,2 - 4,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	30,8	30,8	(30,3 - 31,3)	20,3	(20,2 - 20,4)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	9,2	9,2	(8,9 - 9,5)	5,8	(5,7 - 5,8)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7 583,5	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	300	34,4	(28,7 - 40,6)	ns	29,7	(27,5 - 31,9)	32,6	(32,0 - 33,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017



Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

DÉPENDANCES

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois au cours d'une année, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus	N/D	21,4			21,4	(18,4 - 24,7)	21,2	(20,4 - 22,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	400	50,0	(42,4 - 57,5)	(+)	45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total feux rouges et jaunes	100	11,8	(+)		8,1		6,2	
En émergence (feux jaunes)	100	** 6,2	(3,7 - 10,3)	(+)	3,7	(3,2 - 4,4)	3,3	(3,1 - 3,5)
Problématique (feux rouges)	0	** 5,6	(3,2 - 9,7)	(+)	4,4	(3,6 - 5,3)	2,9	(2,7 - 3,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS						Région		Québec		
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	
Consommateurs actuels de drogues	3 200	14,2	(10,8 - 18,5)	ns	16,6	(12,6 - 21,5)	ns	15,5	(13,8 - 17,3)	16,5	(16,1 - 17,0)
Cannabis seulement	2 800	* 12,6	(9,3 - 16,8)	ns	14,9	(11,0 - 19,8)	ns	14,1	(12,5 - 15,9)	15,1	(14,6 - 15,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Condammations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	IC		Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329			329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Participé à au moins un jeu de hasard et d'argent	N/D	70,4	70,4	(66,6 - 74,1)	63,8	(62,8 - 64,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS Vallée de la Batiscan

SANTÉ MENTALE

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC				
Très satisfaits de sa vie sociale	11 800	53,3	(48,2 - 58,4)	(+)	54,0	(48,5 - 59,5)	(+)	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	400	** 1,7	(0,8 - 3,9)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Population totale						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
65 ans et plus						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques de santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC	% brut	IC	% ajusté	IC				
Ensemble des troubles mentaux	2 620	10,6	(10,0 - 11,2)	(-)	10,5	(10,0 - 11,0)	(-)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	1 535	6,0	(5,6 - 6,5)	(-)	6,1	(5,7 - 6,6)	(-)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	40	0,2	(0,1 - 0,3)	(-)	0,2	(0,1 - 0,2)	(-)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0	30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	1 400	* 12,0	(7,9 - 17,8)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté				
Population de 15 ans et plus	6 200	27,8	(23,0 - 33,2)	ns	29,1	(24,0 - 34,8)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	2 900	24,8	(18,6 - 32,4)	ns	26,4	(19,6 - 34,5)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	3 200	31,1	(24,3 - 38,8)	ns	31,9	(24,8 - 39,9)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	300	35,0	(29,7 - 40,7)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	900	** 4,2	(2,5 - 6,9)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'hospitalisation spécifique à une tentative de suicide, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des tentatives de suicide	12	4,5	(3,2 - 6,3)	ns	5,3	(3,8 - 7,6)	ns	6,5	(6,0 - 6,9)	4,5	(4,4 - 4,6)
Hommes	6	* 4,6	(2,9 - 7,3)	ns	* 5,1	(3,1 - 8,3)	ns	5,1	(4,6 - 5,6)	3,6	(3,5 - 3,7)
Femmes	6	* 4,5	(2,7 - 7,3)	ns	* 5,7	(3,5 - 9,4)	ns	7,9	(7,3 - 8,6)	5,5	(5,3 - 5,6)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique)

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	3	* 11,8	(7,1 - 19,7)	ns	* 12,5	(7,7 - 20,4)	ns	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	12,4	(8,8 - 16,2)	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 8,1	(5,4 - 10,9)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	22,5	(18,1 - 27,1)			31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

Disponibilité géographique

RLS Réseau local de services
RSS Région sociosanitaire

Indicateurs

Incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental

Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue

feu jaune (14 à 19 points) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes en émergence de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention de première ligne est jugée
feu rouge (20 points et plus) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes évidents de consommation de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention spécialisée est

Latitude décisionnelle faible au travail

Une latitude décisionnelle faible au travail correspond davantage aux situations où les travailleurs accomplissent les mêmes choses, ont moins de liberté de décision dans l'accomplissement des

Problèmes de santé de longue durée

Les problèmes de santé de longue durée correspondent aux problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus, diagnostiqués par

Sécurité alimentaire

Alimentation non précaire	sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
Alimentation modérément précaire	insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
Alimentation sévèrement précaire	insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).



*Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec*

Québec 

**CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE
LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC**

Centre administratif Bonaventure

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

www.ciusssmcq.ca