
















# TABLEAU RÉCAPITULATIF SELON LES SITUATIONS - PORT DU MASQUE

APPLICATION SELON L'OFFRE DE SERVICE AU CIUSSS MCQ	PORT DU MASQUE		
	Travailleur de la santé	Usager	Proche aidant / visiteur / accompagnateur
Pour tous les secteurs cliniques : En cas de symptômes d'infection respiratoire chez un usager (toux, fièvre, nez qui coule, autres)	Port de l'équipement de protection individuelle (EPI) complet selon les consignes PCI	 <b>Port obligatoire</b> Appliquer l'étiquette respiratoire	 <b>Port obligatoire</b> Si vous présentez des symptômes, évaluez la possibilité de reporter la visite
Zones cliniques <sup>1</sup> avec usagers ayant un ou des critères de vulnérabilité : <ul style="list-style-type: none"> <li>Usagers hospitalisés sur une unité d'hémo-oncologie (zone sanctuaire, incluant l'ambulatorio et la radio-oncologie) et en néonatalogie;</li> <li>Usagers d'hémo-oncologie ou de néonatalogie hospitalisés sur une autre unité de soins;</li> <li>Usagers avec immunosuppression sévère (greffés de cellules souches, cancer hématologique sous chimiothérapie);</li> <li>Usagers greffés d'organe solide.</li> </ul>	 <b>Port obligatoire</b> en tout temps lors de contact avec l'usager ou son environnement	 <b>Port recommandé</b> Pour l'usager avec critères de vulnérabilité lorsqu'il est en contact avec un TdS à l'intérieur de son environnement (ex. : chambre, cubicule, salle de traitement) ou lorsqu'il sort de son environnement (ex. : examen)	 <b>Port obligatoire</b> En tout temps lors de contact avec l'usager ou son environnement
Zones cliniques <sup>1</sup> avec usagers sans critère de vulnérabilité	 <b>Port facultatif**</b>	 <b>Port facultatif</b>	 <b>Port facultatif</b>
Zones non cliniques	 <b>Port facultatif**</b>	N/A	N/A
En contexte d'éclosion ou de mise sous tension (COVID-19 ou autres)	 OU  <b>Port obligatoire</b> Selon les consignes de la PCI	 <b>Port recommandé (si apte)</b>	 <b>Port obligatoire</b>
<b>**Pour les travailleurs de la santé seulement</b>			
Directive : <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors d'un contact ponctuel, domiciliaire, limité ou continu, entre le travailleur et un cas positif de COVID-19</li> <li>En présence de symptômes d'une infection respiratoire autre que COVID-19</li> </ul>	 <b>Port obligatoire</b> et auto-surveillance des symptômes	Directive : Pour le travailleur positif à la COVID-19 en retour précoce  <b>Port obligatoire</b> en tout temps jusqu'à la fin de son isolement de 10 jours	

<sup>1</sup>Milieux de soins visés par les présentes recommandations : Milieux de soins de courte durée (unités de soins et urgence) et ambulatoires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille et cliniques externes des milieux hospitaliers); Installations de santé mentale, unités de soins de santé mentale en milieu hospitalier et urgences psychiatriques; Installations de réadaptation en déficience physique; Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); Autres milieux ou unités de soins qui s'apparentent à des soins de longue durée (ex. : Unité de soins en Résidences privées pour aînés (RPA) ou autres milieux similaires qui s'apparentent à des soins de longue durée); Soutien à domicile (SAD).